

**SEZNAM SLOVENSkih IMEN V SLOVENIJI ŽIVEČIH PEDICEV
(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE)**Matjaž JEŽ¹ in Jernej LAVBIČ²¹Velika Mislinja 15, 2382 Mislinja; e-mail: matjaz.jez@gmail.com²Ljubljanska cesta 18, 3000 Celje; e-mali: jernej.lavbic@gmail.com

Izvleček – Predstavljen je seznam pedicev (Geometridae) Slovenije z znanstvenimi in slovenskimi binarnimi imeni, ki obsega 168 rodov in 465 vrst. Izhodišče tega seznama je Hafnerjev seznam metuljev Kranjske iz leta 1910, ki je dopolnjen s Carneluttijevim seznamom iz leta 1992. Seznama sta favnistično dopolnjena ter taksonomsko posodobljena tudi z drugimi javno dostopnimi in lastnimi podatki. Osnovni namen članka je predstaviti slovenska imena pedicev (Geometridae) in kratko zgodovino njihovega nastajanja v Sloveniji. Določena so bila po načelu Linejeve binarne nomenklature ob upoštevanju etimologije latinskih imen in lastnosti metuljev.

KLJUČNE BESEDE: Geometridae, Lepidoptera, Slovenija, etimologija, pedici, slovenska imena.

Abstract – A CHECKLIST OF SLOVENIAN NAMES OF GEOMETRIDAE MOTHS LIVING IN SLOVENIA (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE)

A checklist of geometer moths (Geometridae) of Slovenia with scientific and Slovenian binary names is presented, comprising 168 genera and 465 species. The list is based on Hafner's 1910 list of butterflies of Carniola, supplemented by Carnelutti's 1992 list. The two lists were updated faunistically and taxonomically using other publicly available and our own data. The main purpose of this paper is to present the Slovenian vernacular names of geometer moths and the method used to derive them. A brief history of the development of Slovenian names is also presented. Slovenian names were determined according to the principle of Linné's binary nomenclature, taking into account the etymology of the scientific names and a nature of Geometridae moths.

KEY WORDS: Geometridae, Lepidoptera, Slovenia, etymology, Slovenian vernacular names

UVOD

Ta prispevek je nadaljevanje prispevkov o slovenskih imenih sovk (Noctuidae) (Jež in Lavbič 2023a) in erebid (Erebidae) (Jež in Lavbič 2023b). Zato nekaterih poglavij iz uvoda ne ponavlja. Seznam znanstvenih imen v Sloveniji živečih pedicev (Geometridae) je pripravil drugo imenovani avtor na osnovi javno dostopnih favnističnih in taksonomskih podatkov. Prvo imenovani avtor je pripravil etimologijo znanstvenih imen in slovenska imena. Za lažje razumevanje posebnosti te družine sva dodala še kratki pregled značilnosti metuljev te velike in zanimive družine.

O RAZVOJU DRUŽINE GEOMETRIDAE

Izraz GEOMETRAE, kot sinonim za današnje GEOMETRIDAE, je uvedel že Linnaeus (C. Linnaeus, 1707 – 1778, v nadaljevanju Line) v deseti knjigi svojega znamenitega dela *Systema naturae* leta 1758. Vse nočne metulje je uvrstil v veliko skupino PHALAENA, kar danes razumemo kot nočnike ali Nocturna. Ime Phalaena je povzel po grški besedi *phalain* s katero je Aristotel označeval molje. Razdelil jih je na sedem manjših skupin: Bombyces, Noctuae, Geometrae, Tortrices, Pyralides, Tineae in Alucitae. Te skupine ali *falange* kot jih je imenoval, niso označevale taksonomskega položaja v današnjem pomenu besede, so pa najbližje rangu naddružin. Za Geometrae je poudaril, da plosko (horizontalno) zlagajo krila, razdelil pa jih je v dve skupini: na *Pectinicornes* (*pecto* glevnik, glavnikast), ki imajo glavnikaste tipalnice in *Seticornes*, (*seta* ščetina, dlaka) ki imajo nitaste tipalnice (Emmet, 1991). Ime družine Geometridae, kot taksonomske kategorije v današnjem pomenu besede, je uvedel šele britanski zoolog W. E. Leach (1791 – 1836) leta 1815.

Med pri nas živečimi pedici jih je Line v omenjenem delu je opisal 52, ki so bili vsi v skupini Phalaena. V tem primeru je bilo ime Phalaena v funkciji rodovnega imena, čeprav formalno ni imelo tega taksonomskega položaja. To imenovanje je še danes vidno pri starejših sinonimih oziroma originalnih kombinacijah imen kot so: *Phalaena prunaria* za danes veljavno *Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758), *P. pinaria* za *Bupalus pinaria* (Linnaeus, 1758) in *P. atomaria* za *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758). Pri imenovanju pedicev je Line naredil eno samo izjemo in sicer pi vrsti *Geometra papilionaria* Linnaeus, 1758, ki je ni uvrstil v Phalaena, ampak je za njo uvedel rodovno ime Geometra, vrsta pa je edina med našimi pedici, pri kateri se je ohranilo njegovo izvorno imenovanje. Linejevemu zgledu je že naslednje leto sledil K. A. Clerck (1710 – 1765), švedski entomolog in ilustrator metuljev, odlični Linejev učenec. Opisal je 11 vrst pri nas živečih pedicev, med njimi *Phalaena defoliaria*, danes *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759).

Med zgodnjimi imenovalci metuljev ne moremo prezreti Scopolija, ki je leta 1763 opisal tudi več pedicev s Kranjske, za 18 med njimi pa so še danes veljavna njegova imena. Tudi on je vse uvrstil v skupino Phalaena, danes pa so uvrščeni v 15 različnih rodov. Med njimi so *Phalaena exanthemata*, danes *Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763), *P. cervinalis*, danes *Hydria cervinalis* (Scopoli, 1763) in *P. ochrata*,

danes *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763). Za tri med njimi, Scopolijev ledenikar, *Psodos alpinata* (Scopoli 1763), Scopolijev metlarček, *Scopula ornata* (Scopoli, 1763) in Scopolijev temnikar, *Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763), smo se odločili, da jih imenujemo njemu v spomin.

Opisovanje novih rodov metuljev se je pričelo v večjem obsegu šele s Hübnerjem (Hübner J. 1761 – 1826), nemškim entomologom in ilustratorjem metuljev, ki je med leti 1799 in 1825 opisal veliko novih rodov in vrst. Med 168 rodovi pri nas živečih pedicev, jih kar 71 nosi njegov podpis, dodal pa je še opise 65 vrst. Najuspešnejša opisovalca pedicev naših krajev sta bila Dunajčana M. Denis in I. Schiffermüller, ki sta opisala 76 vrst, 60 vrst je Linejevih, 18 pa jih je prispeval Scopoli. Danes obsega družina Geometridae v svetu kakih 2000 rodov s 23.000 vrstami, za Evropo pa je število vrst konec leta 2023 ocenjeno na 1.126 (*Lepiforum* 2023).

Pedici so dobili svoje ime po lastnosti gosenic (Erjavec 1880). Večina gosenic metuljev ima osem parov nog: tri pare pravih nog na oprsju ter štiri pare trebušnih in en par zadkovih panožic; gosenice pedicev pa imajo le pet parov nog: po tri pare pravih nog na prsnem delu in po dva para panožic na koncu telesa. Ta anatomska značilnost jim omogoča posebni način gibanja, ki ga imenujemo pednjanje. Poteka tako, da gosenica vzdigne zadek in ga potegne naprej do prsnega dela telesa, kjer se oprime podlage, hrbet pa zvije navzgor v obliki značilnega loka. Potem vzdigne sprednji del telesa, ga iztegne naprej in se oprime podlage pred sabo (Erjavec 1864).

Tak način gibanja, pednjanje, s katerim *se meri zemlja* je uporabil že Line kot izhodišče za določitev imena skupine Geometrae in rodu Geometra (Emmet, 1991), uporabil pa ga je tudi Mayerick leta 1892 za imenovanje rodu Rhodometra (*rhodon* roža, *metron* mera, dolžina), kjer pa gosenice *merijo rože*. Pednjanje ali temu podobno gibanje, imajo tudi nekatere gosenice iz družine Erebidae, kot na primer pri rodu Phytometra (*phuton* rastlina, *metron* mera, dolžina) kjer pa gosenice *merijo rastline*.

O RAZVOJU SLOVENSКИH ZNANSTVENIH IMEN PEDICEV

Pionirsko delo Frana Erjavca (1834 – 1887)

Ključna dela F. Erjavca, v katerih je uporabil slovenska imena nočnih metuljev so **Živalstvo, Prirodopis za nižje gimnazije in realke** (Pokorny/Erjavec 1864), **Naše škodljive živali v podobi in besedi** (Erjavec 1880) in **Prirodopis živalstva s podobami** (Pokorny/Erjavec 1881). V prvi izdaji »Živalstva« je navedel dve vrsti, velikega in malega zmrzlikarja. Pedice je tudi na kratko opisal in razložil še nastanek njihovih imena. Takole pravi: »Pedici so ponočnjaki z dolgimi nitkastimi tipalnicami, dolgim, tankim trupom in imajo primerno široka in tanka, v miru ravno sprosterta krila. Posebno čudne so gosenice in njihovo gibanje, in od tega gibanja so dobili tudi ime. Imajo namreč le šest persnih in štiri trebušne noge, ki so pa prav na koncu trupla, tako da v sredi trupa nimajo nikakršnih nog. Kedar hodijo, se zgerbančijo in se zdaj s sprednjimi, zdaj z zadnjimi nogami poprijemajo, ravno tako kakor če mi z roko ped merimo«.

Tabela 1: Primerjalni prikaz latinskih in slovenskih imen pedicev iz treh Erjavčevih del. Imena so napisana v izvirni obliki.

| Znanstveno ime | Pokorny/Erjavec 1864 | Erjavec 1880 | Pokorny/Erjavec 1881 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>Acidalia brumata</i> | Zimski pedic | Zmrzlikar mali | Mali zimski pedic |
| <i>Hibernia defoliaria</i> | | Zmrzlikar veliki | Veliki zimski pedic |
| <i>Hibernia bajarija</i> | | Zmrzlikar višnjev | |
| <i>Fidonia piniaria</i> | | Pedic borov | |
| <i>Zerene grossulariata</i> | Kosmuljni pedic | Šarec, Harlekin | Šarec, kosmulji pedic |
| <i>Scopula margiaritalis</i> <i>Evergestis extimalis</i> | | Vešča repična | |

Schwentnerjevi »Metulji v podobah«

Naslednje delo, ki je pomembno za razvoj slovenskih imen pedicev, je Schwentnerjeva knjižica metulji v podobah. Izšla je leta 1907 (Anonimno 1907) kot prirejeni ponatis nemškega originala iz leta 1900 (Anonimno 1900) s slovenskimi, nemškimi in latinskimi imeni 129 vrst metuljev, med katerimi je 29 pedicev. V predhodnih člankih o slovenskih imenih sovk in erebid (Jež in Lavbič 2023a in b) je bila navedena domnevna letnica izida knjižice okrog leta 1920. Z odkritjem novih virov lahko zdaj navajava natančne podatke.

Tabela 2: Primerjalni prikaz latinskih in slovenskih imen pedicev iz knjižice Metulji v podobah. Imena so napisana v izvirni obliki.

| Slovenska imena | Latinska imena |
|---------------------|---------------------------------|
| Brezov trakarček | <i>Brephos parthenias</i> |
| Bezgov pedic | <i>Urapteryx sambucaria</i> |
| Beli šarec | <i>Abraxas grossulariata</i> |
| Slivar | <i>Angerona prunaria</i> |
| Lipovček | <i>Pericallia syringaria</i> |
| Pasanček | <i>Biston zonarius</i> |
| Zelenček | <i>Geometra papilionaria</i> |
| Kovačnikov pedic | <i>Crocallis elinguarua</i> |
| Tigerček | <i>Venilia macularia</i> |
| Glogov pedic | <i>Opisthograptis luteolata</i> |
| Lepotič | <i>Acidalia decorata</i> |
| Gozdni panterček | <i>Abraxas sylvata</i> |
| Škrlatar | <i>Rhodostrophia calabraria</i> |
| Leskov pedic | <i>Abraxas marginata</i> |
| Planinski pedic | <i>Psodos quadrifaria</i> |
| Veliki zimski pedic | <i>Hibernia defoliaria</i> |
| Črnivec | <i>Odezia atrata</i> |
| Valoviti pedic | <i>Eucosmia undulata</i> |
| Malinov pedic | <i>Larentia albicillata</i> |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Brezov pedic | <i>Amphydasis betularia</i> |
| Šentjanževček | <i>Anaitis plagiata</i> |
| Mali zimski pedic | <i>Cheimatobia brumata</i> |
| Dvočrtnik | <i>Larentia bilineata</i> |
| Borov pedic | <i>Bupalus piniarius</i> |
| Suličar | <i>Larentia hastata</i> |
| Škrlatasti pedic | <i>Lythria purpuraria</i> |
| Lakotovec | <i>Larentia ocellata</i> |
| Mreževček | <i>Phasiana clathrata</i> |
| Žilavček | <i>Eupithecia venosata</i> |

Metulji Slovenije, Jurij Kurillo

Pomemben prispevek k razvoju slovenskih imen metuljev je dal tudi dr. Jurij Kurillo v delu *Metulji Slovenije* (1992), ki je praktični priročnik za prepoznavanje in opazovanje naših metuljev. Izdala ga je Državna založba Slovenije leta 1992. V njej je predstavljenih v sliki in besedi 20 vrst pedicev.

Tabela 3: Seznam slovenskih in latinskih imen pedicev iz knjige *Metulji Slovenije*. Imena so napisana v izvorni obliki.

| Slovenska imena | Latinska imena |
|-------------------------|---------------------------------|
| Brezov pedic | <i>Biston betularia</i> |
| Leskov pedic | <i>Lomaspilis marginata</i> |
| Ščetinasti pedic | <i>Lycia hirtaria</i> |
| Jelšev pedic | <i>Cabera pusaria</i> |
| Smrekov pedic | <i>Thera variata</i> |
| Lakotni pedic | <i>Epirrhoe galiata</i> |
| Mreževček | <i>Chiasmia clathrata</i> |
| Tigerček | <i>Pseudopanthera macularia</i> |
| Navadni škrlatar | <i>Rhodostrophia vibicaria</i> |
| Slivar | <i>Angerona prunaria</i> |
| Navadni zobnik | <i>Ennomos erosaria</i> |
| Gozdni panterček | <i>Abraxas sylvata</i> |
| Srobotov zelenček | <i>Hemistola chrysoprasaria</i> |
| Somračni pedic | <i>Ectropis bistortata</i> |
| Valoviti pedic | <i>Calocalpe undulata</i> |
| Glogov ali rumeni pedic | <i>Opisthograptis luteolata</i> |
| Gabrov pedic | <i>Campaea margaritata</i> |
| Oljčni pedic | <i>Peribatosed umbraria</i> |
| Veliki skalnik | <i>Gnophos fulvata</i> |
| Gorski skalnik | <i>Gnophos dilucidaria</i> |

Kumulativna vsota vseh treh seznamov je 43 vrst, nobena pa ni skupna vsem trem seznamom.

Zanimiv primer med Erjavčevimi vrstami je *Scopula margiaritalis* ali *repična vešča*. Takrat so jo zmotno uvrščali med pedice, čeprav sodi v družino Pyralidae z današnjim imenom *Evergestis extimalis* (Scopoli, 1763). Zato vrsta ni vključena v kumulativni seštevek. Tudi pri Schwentnerjevih vrstah najdemo nekaj podobnega. *Brezov trakarček*, *Brephos parthenias* [danes brezov pomladnik, *Archiearis parthenias* (Linnaeus, 1761)] je upodobljen med sovkami, slovensko ime »trakarček« in nemško »birkeneule« pa potrjujeta, da so tega pedica takrat napačno uvrščali med sovke. Zanimiv primer je pasanček, *Biston zonarius*, [danes pasasti volčič, *Lycia zonaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)], ki pa ne živi v Sloveniji. To je povezano z dejstvom, da je bila knjižica izdana za območje takratne Avstro-Ogrske, kjer je bila vrsta prisotna. Po spremembi državnih meja po prvi svetovni vojni pa je območje razširjenosti pasančka ostalo v Avstriji, za Slovenijo pa o tej vrsti tudi danes nimamo nobenega podatka. Pri vrsti *Venilia macularia*, za katero Schwentner navaja slovensko ime *tigerček* in nemško *tigerchen*, se je zapletlo pri imenu. Značilni vzorec tigra so ozke temne črte na rumeni podlagi, naš metuljček pa nima črt ampak izrazite pege, ki so značilne za panterja, in na te pege se nanaša tudi latinsko vrstno ime *macularia*. Pri določitvi nemškega imena se je očitno zgodil spodrseljaj, ki sta ga nekritično povzela tudi Schwentner in Kurillo. Zato smo se pri določitvi novega slovenskega imena, *rumeni panterček*, oprli na pomen znanstvenega imena *Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758) in na dejanski vzorec metulja.

Podatkovne zbirke prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Pomembni vir slovenskih imen metuljev sta tudi *Imenik slovenskih imen nevretenčarjev* (Trilar in sodelavci 2023) in *Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev* (Trilar in Knapič, 2023), ki jih ureja Prirodoslovni muzej Slovenije. V obeh zbirkah je predstavljenih tudi veliko pedicev. Navedena so tudi slovenska imena, ki pa le izjemoma ustrezajo merilom binarnega imenovanja. Ne glede na pomanjkljivosti pa sta omenjeni zbirki najpopolnejši seznam slovenskih imen.

METODA DELA

Za določitev slovenskih znanstvenih imen pedicev (Geometridae) je bila uporabljena metoda postopnosti oziroma treh korakov.

Najprej je bila pridobljena etimološka razlaga veljavnih znanstvenih imen vseh obravnavanih rodov in vrst. Pri tem je bila uporabljena etimologija po A. Spulerju (1910) in A. M. Emmetu (1991). Za imena, za katera omenjena avtorja ne navajata etimologije, je bil pomen določen iz pomena latinskih imen s pomočjo grško-slovenskega (Dokler, 1999) in latinsko-slovenskega slovarja (Wiesthaler, 1993-2007). Tako so bila najprej določena slovenska imena rodov, ki so vedno samostalniki. V naslednjem koraku so bila na enak način določena slovenska imena vrst, ki so vedno pridevniki. Pri določanju rodovnih in vrstnih imen pedicev so bile upoštevane tudi njihove lastnosti kot so videz (barva, vzorec, oblika), hranilna rastlina, življenjsko

okolje, dnevni ali letni čas pojavljanja in podobno. V nekaterih primerih se ime nanaša tudi na lastnosti gosenic. Vsa rodovna in vrstna imena pedicev so slovnično moškega spola.

SEZNAM VRST

Rezultat dela je okvirni seznam v Sloveniji živečih pedicev (Geometridae) z znanstvenimi in slovenskimi imeni. Vsa slovenska imena so binarna in temeljijo na Linejevi definiciji binarnega imenovanja. Seznam obsega 168 rodov in 465 vrst. Ker domnevava, da obstajajo dodatni, še neobjavljeni podatki o pedicah Slovenije, ocenjujeva, da bi lahko bilo njihovo dejansko število višje. Seznam je urejen v obliki tabele, ki je prikazana v prilogi 1.

ZAHVALA

Zahvaljujeva se Barbari Zakšek in Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije za pobudo za pripravo slovenskih binarnih imen pedicev ter vsem drugim, ki so kakor koli prispevali k nastanku tega članka. Zahvaljujeva se tudi dr. Tomiju Trilarju za posredovane podatke iz baze Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

VIRI

- Anonimno 1900:** Schmetterlings-Atlas in Taschenformat: 129 Abbildungen in Farbendruck mit Angabe der deutschen und lateinischen Namen, Mück's praktische Taschenbücher 3, Wien 1900: G. Szelinski & Comp. 32. str.
- Anonimno 1907:** Književne novosti. Metulji v podobah. Ljubljanski zvon, 27(6), 379.
- Carnelutti J. 1971:** IV. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 19: 169-180.
- Carnelutti J. 1978:** V. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 26(2): 175-182.
- Carnelutti J. 1989:** VI. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 37: 1-9.
- Carnelutti J. 1992a:** Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave 17(17): 61-104.
- Carnelutti J. 1992b:** Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji (Popravki/Errata). Varstvo narave 18(18): 189-190.
- Carnelutti J., Michieli Š. 1955:** Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 4: 43-55.
- Carnelutti J., Michieli Š. 1960:** II. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 7: 113-124.
- Carnelutti J., Bartol V., Sušec-Michieli Š. 1965:** III. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 13: 69-76.
- Deutsch H. 2019:** Contribution to the Lepidopteran Fauna of Slovenia - Julian Alps,

Coastal Areas.:1-267.

- Dokler A. 1999:** Grško slovenski slovar. Cankarjeva založba Ljubljana, 848 str.
- Emmet A. M. 1991:** The scientific names of the British Lepidoptera – their history and meaning. Harley Books, Colchester, England, 288 str.
- Erjavec F. 1880:** Naše škodljive živali v podobi in besedi. Družba sv. Mohorja v Celovcu 1880, 336 str.
- Gomboc S. 1999:** Dva nova taksona v slovenski favni metuljev (Lepidoptera). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 7(1): 69-71.
- Habeler H. 2011:** Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883), eine für Slowenien neue Geometride (Lepidoptera: Geometridae). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 19(2): 199-201.
- Habeler H., Gomboc S. 2005:** Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Slowenien mit erstnachweisen. Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 13(1): 29-52.
- Hafner J. 1910:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 1(3/4): 243-262.
- Hafner J. 1911a:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 2(1): 58-73.
- Hafner J. 1911b:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 2(4): 290-309.
- Hafner J. 1911c:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 3(1): 43-75.
- Hoffmann F., Klos R. 1917:** Die Schmetterlinge Steiermarks IV. Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermar 53 : 47-209.
- Jež M., Lavbič J. 2023a:** Seznam slovenskih imen v Sloveniji živečih sovč (Lepidoptera, Noctuidea). Acta entomologica Slovenica (Ljubljana), 31(1): 27 – 75.
- Jež M., Lavbič J. 2023b:** Seznam slovenskih imen v Sloveniji živečih erebid (Lepidoptera, Erebidae). Acta entomologica Slovenica (Ljubljana), 31(2): 163 – 184.
- Karsholt O., Razowski J. 1996:** The Lepidoptera of Europe. A distributional Checklist. Apoolo Books, Stenstrup 1996, 380 str.
- Kurillo J. 1992:** Metulji Slovenije. Državna založba Slovenije 1992, zbirka Narava Slovenije, stran 172 - 191.
- Lasan M. 1997:** Nekaj novih vrst v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije. Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 5(1): 51-58.
- Lasan M. 2000:** Nove vrste v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije. Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 8(2): 137-146.
- Leraut P. 2008:** Contribution à l'étude du genre *Sciadia* Hübner, 1822 (Lepidoptera, Geometridae). Bulletin de la Société entomologique de France 113(2): 177-182.
- Lesar T. 1998a:** *Lomographa dilectaria* Hübner, 1799, v severovzhodni Sloveniji (Lepidoptera: Geometridae). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 6(1): 46.
- Lesar T. 1998b:** *Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787), nova vrsta v slovenski favni metuljev (Lepidoptera: Geometridae). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 6(2): 143-144.
- Mladinov L. 1980:** Lepidoptera iz doline gornjeg toka rijeke Kupe IV. Geometridae. Acta entomologica Jugoslavica 16(1): 69-91.

- Pokorny A. 1864:** Živalstvo. Prirodopis za nižje gimnazije in realke. Spisal A. Pokorny, poslovenil F. Erjavec. Celovec, 93 – 97 str.
- Pokorny A. 1881:** Prirodopis živalstva s podobami. Za spodnje razrede srednjih šol. Izdelal dr. Alojzij Pokorny, poslovenil Erjavec F. Matica slovenska v Ljubljani, 191 – 199 str.
- Rennwald E., Rodeland J. 2021:** Lepiforums-Europaliste. 1.2. Version 8.3.: 20. 3. 2021.
- Spuler A. 1910:** Die Schmetterlinge Europas, Stuttgart. II. Band 385 str.
- Stauder H. 1929:** Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). 4. Abschnitt. Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae. Ent. Anzeiger Wien 9: 397-403.
- Sukič M., Kodran T. 2007:** *Lycia isabellae* (Harrison, 1914) (Geometridae) in *Xestia sexstrigata* (Haworth, 1809) (Noctuidae) - novi vrsti v favni metuljev Slovenije (Lepidoptera). Acta entomologica slovenica (Ljubljana), 15(2): 127-130.
- Štanta R. 2000:** Dve novi vrsti v slovenski favni metuljev (Lepidoptera). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 8(1): 84-86.
- Trilar T., Knapič T. 2024:** Imenik slovenskih imen nevretenčarjev. Prirodoslovni muzej Slovenije <http://www1.pms-lj.si/imenik/imenik.php/>. Dostop 20.1.2024.
- Trilar T., Štangelj M., Sivec I. 2024:** Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev. Prirodoslovni muzej Slovenije. <http://www1.pms-lj.si/animalia/>. Dostop 20.1.2024.
- Wiesthaller F. 1993 – 2007:** Latinsko – slovenski slovar, del 1 – 6.
<https://fauna-eu.org>. Dostop 15.12.2023
<https://lepiforum.org>. Dostop 15.12.2023
<https://en.wikipedia.org>. Dostop 15.12.2023

PRILOGA I:

Stolpec A – koda vrst po Karsholt & Razowski 1996; stolpec B – znanstveno ime družina/podružina/rod/vrsta in imena avtorjev latinskih imen po Rennwald & Dodeland 2021; stolpec C – viri; stolpec D – etimologija; stolpec E – slovensko ime. Okrajšave v stolpcu D pomenijo: S Spuler 1908 in 1910, E Emmet 1991, D Dokler 1999 in W Wiesthaler 1993–2007.

| KR-Št. | Znanstveno ime | Vir | Etimologija | Slovensko ime |
|--------|--|----------------------------|---|-------------------------------------|
| | <i>GEOMETRIDAE</i> Leach, 1815 | | E <i>geometreo</i> meriti zemljo; glede na pednjajoče premikanje gosenic. | PEDICI |
| | <i>Abraxas</i> Leach, [1815] | | E <i>Abraxas</i> stara mistična figura; brez metuljarskega pomena; 2 <i>šarec</i> glede na pisani vzorec kril. | šarec |
| 7522 | <i>A. grossulariata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>Ribes grossulariata</i> ; bot. rod ribez, ena od hramlinih rastlin gosenic. | ribezov šarec |
| 7525 | <i>A. pantaria</i> (Linnaeus, 1767) | Carnelutti, 1971 | E <i>panthera</i> panter; glede na lisasti vzorec kril. | lisasti šarec |
| 7524 | <i>A. sybata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911b | E <i>syba, siha</i> gozdi; glede na značilno življenjsko okolje. | gozdni šarec |
| 8682 | <i>Acasis Duponchel</i> , 1845 <i>A. appensata</i> (Eversmann, 1842) | Carnelutti & Micheli, 1955 | E <i>a-</i> brez, <i>kasis</i> brat; brez brata; edinček. 2 <i>gubarček</i> glede na kožno gubo ali krpo (halter) na bazi zadnjih kril samčkov. | gubarček |
| 8681 | <i>A. viretata</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | S <i>appendeo</i> obešen, povešen; glede na povešene krilne krpe samcev. | povešavi gubarček |
| 7802 | <i>Aethalura</i> McDunnough, 1920 <i>A. punctulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911b | E <i>viretum</i> zelena pika, zelen; glede na značilno barvo kril. E <i>aithalos</i> dim, <i>ouron</i> meja; glede na zlitje, zabrisanost prečnih črt na krilih. 2 <i>dimar</i> glede na dimasti, zabrisani vzorec kril. E <i>punctulum</i> majhne pike, lise. Glede na vzorec malih lis na sprednjih krilih. | dimar drobnolisi dimar |
| 7695 | <i>Agriopsis</i> Hübner, [1825] <i>A. aurantiaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1911b | E - <i>agrios</i> - divji, neukročen; 2 <i>mrzarnik</i> glede na letni čas pojavljanja vrst tega rodu. S <i>aurantiaria</i> oranžen, oranžni; glede na barvo, ki spominja na <i>Citrus aurantium</i> , bot. rod pomaranča. | mrzarnik oranžni mrzarnik |
| 7694 | <i>A. bajaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911b | S <i>baios</i> majhen, nezaten; glede na majhna, zakrnela krila samic; 2 <i>rjavi</i> glede na značilno rjavo barvo kril. | rjavi mrzarnik |
| 7693 | <i>A. leucophaea</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911b | S <i>leucophaeos</i> belostvi; <i>belkasti</i> glede na značilno sivo belo lisasti vzorec kril. | belkasti mrzarnik |

| | | | | |
|------|--|-------------------|---|------------------------|
| 7696 | <i>A. marginaria</i> (Fabricius, [1771]) | Hafner, 1911b | S <i>margo marginis</i> rob, obrobljen; glede na s črnimi pikami obrobljena krila. | obrobljeni mraznik |
| | <i>Alcis</i> Curtis, 1826 | | E <i>Alcis</i> heč Aegyptusa. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>rogovilar</i> glede na močne prečne črte na krilih, ki spominjajo na rogovile. | rogovilar |
| 7778 | <i>A. deversata</i> (Staudinger, 1892) | Carmelutti, 1989 | S <i>deversus</i> različen, drugačen; se razlikuje od predhodnih. 2 <i>črnolisti</i> po značilnih črnih lisah in pasovih na krilih. | črnolisti rogovilar |
| 7779 | <i>A. jubata</i> (Thunberg, 1788) | Hafner, 1911b | E <i>jubatus</i> griva, greben; glede na rahli greben na oprsju. | grebenasti rogovilar |
| 7777 | <i>A. repandata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>repandus</i> upognjeni, <i>krivočrti</i> ; glede na ukrivljeno zunanjo prečno črto na srednjih krilih. | krivočrti rogovilar |
| | <i>Aleucis</i> Guenee, 1845 | | E <i>a-</i> zanikanje; <i>leucos</i> beli; tisti, ki ni bel, ne beli. 2 <i>trnar</i> po črnem trnu, <i>Prunus spinosa</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | trnar |
| 7831 | <i>A. distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839) | Carmelutti, 1992a | E <i>distinctus</i> drugačen, različen. 2 <i>pomladni</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev. | pomladni trnar |
| | <i>Alsophila</i> Hübner, [1825] | | E <i>alsos</i> log, gaj, hosta. 2 <i>prekrlinik</i> v sedečem položaju zлага krila tako, da se prekrivajo. | prekrlinik |
| 7954 | <i>A. aceraria</i> (Denis & Schiffmüller), 1775) | Hafner, 1911b | S <i>acer</i> javor bot. rod <i>Acer</i> sp.; <i>javorov</i> po značilni hranilni rastlini gosenic. | javorov prekrlinik |
| 7953 | <i>A. aescularia</i> (Denis & Schiffmüller), 1775) | Hafner, 1911b | E <i>aesculus</i> izvorno hrast (<i>Quercus petraea</i>), <i>hrastov</i> po značilni hranilni rastlini gosenic. | hrastov prekrlinik |
| | <i>Angerona</i> Duponchel, 1829 | | E <i>Angerona</i> ime boginje tišine; brez metuljarskega pomena. 2 <i>vrbar</i> po vrbi, <i>Salix</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic te polifage vrste. | vrbar |
| 7665 | <i>A. prunaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>Prunus spinosa</i> bot. <i>črni trn</i> , po hranilni rastlini gosenic. 2 <i>oranžni</i> glede na značilno barvo te zelo spremenljive vrste. | oranžni vrbar |
| | <i>Anticlea</i> Stephens, 1831 | | E <i>Anticlea</i> ime Odisejeve matere, brez metuljarskega pomena. 2 <i>šipkar</i> glede na šipek, <i>Rosa</i> sp., hranilno rastlino gosenic. | šipkar |
| 8310 | <i>A. derivata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775) | Hafner, 1911a | E <i>derivo</i> vijugav, vijuganje; glede na vijugasto črto v apikalnem delu krila. | vijugavi šipkar |
| | <i>Anticollix</i> Prout, 1938 | | E <i>anti</i> namesto <i>Collix</i> , namesto rodu <i>Collix</i> . 2 <i>pjavčničar</i> po pjavčnici, <i>Lysimachia vulgaris</i> , hranilni rastlini gosenic. | pjavčničar |
| 8607 | <i>A. sparsata</i> (Treitschke, 1828) | Hafner, 1911a | E <i>sparsata</i> z blatom poškropjen; glede na črne in bele lesketajoče luske na krilih. | lesketajoči pjavčničar |
| | <i>Apeira</i> Meyrick, 1892 | | E <i>apeiros</i> ki ne pride do konca; glede na osrednjo liso, ki se konča pred robom krila. | lipovkar |
| 7630 | <i>A. syringaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>Syringa vulgaris</i> španski bezeg, lipovka; po značilni hranilni rastlini gosenic. | belolisti lipovkar |

| | | | | |
|------|--|-------------------------------|---|--|
| | <i>Aplasta</i> Hübner, [1823] | | <i>E aplastus</i> neoblikovan, preprosti. 2 <i>gladežnikar</i> glede na gladežnik, <i>Ononis</i> sp. značilno hranilno rastlino gosenic. | gladežnikar |
| 7961 | <i>A. ononaria</i> (Fuessly, 1783) | Hafner, 1910 | <i>E ononis</i> bot. rod <i>Ononis</i> gladežnik. 2 <i>preprosti</i> glede na vzorec srednjih kril. | preprosti gladežnikar |
| 8622 | <i>Aplocera</i> Stephens, 1827 | | <i>E haplos</i> enostaven, preprosti; <i>keras</i> rog, antene; glede na antene. 2 <i>krčničar</i> po krčnici, <i>Hypericum</i> sp., hranilni rastlini gosenic. | krčničar |
| 8620 | <i>A. efformata</i> (Guenée, [1858]) | Camelutti & Michieli, 1960 | <i>E ex-</i> izven formata; drugačen kot prejšnja vrsta, še posebej glede velikosti zadka. | peščinski krčničar |
| 8624 | <i>A. plagiata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | <i>E plaga</i> proga, črta; glede na očitne proge na srednjih krilih. 2 <i>veliki</i> glede na velikost, saj je največji med našimi krčničarji. | veliki krčničar |
| 8625 | <i>A. praeformata</i> (Hübner, [1826]) <i>A. simpliciatata</i> (Treitschke, 1835) | Hafner, 1910 Hafner, 1911c | <i>E prae-</i> visoko, na visokem nivoju; <i>formatus</i> dobre oblike ali kroja. 2 <i>gorski</i> glede na značilno življenjsko okolje. | gorski krčničar visokogorski krčničar |
| 7671 | <i>A. hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Camelutti & Michieli, 1960 | <i>E apo-</i> po, pozneje <i>kheima</i> zima. 2 <i>zimnik</i> glede na zimo, značilni letni čas pojavljanja metuljev. | zimnik kocinasti zimnik |
| 7517 | <i>Archicaris</i> Hübner, [1823] | | <i>E hispidus</i> dlakasti, kocinasti; glede na dolge, močne, kocinam podobne luske. | pomladnik brezov pomladnik |
| 7645 | <i>Artiora</i> Meyrick, 1892 | Hafner, 1910 | <i>E arkte, arkhi-</i> pričetek; <i>ear</i> pomlad; glede na letni čas pojavljanja metuljev. | podkrilnik trdoleskin podkrilnik |
| 7794 | <i>A. selenaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911b | <i>E parthenias</i> sin konkurbine; brez metuljarskega pomena. 2 <i>brezov</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic. | mesecar svetli mesečar |
| 7926 | <i>Aspitates</i> Treitschke, 1825 | Hafner, 1911b | <i>D artios</i> pristojen, primeren; <i>orao</i> videti; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>podkrilnik</i> ker v mirovanju zloži zadnja krila pod srednja. | okrar pisani okrar |
| | <i>A. ochrearia</i> (Rossi, 1794) | Hafner, 1911b | <i>S Evonymus</i> , bot. rod trdoleska <i>Evonymus</i> ; po trdoleski, <i>Evonimus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | čipkarček |
| | <i>Asthena</i> Hübner, [1825] | | <i>E a-</i> zanikanje <i>scotos</i> tema, temno; ki ni temen. 2 <i>mesečar</i> glede na polmesečasto znamenje na srednjih krilih. | |
| | | | <i>E selene</i> luna, mesec. 2 <i>svetli</i> glede na svetlo barvo kril. | |
| | | | <i>E domnevno</i> popravek po <i>aspilates</i> , arabski dragi kamen po Pliniju. 2 <i>okrar</i> glede na značilno okrasto barvo kril. | |
| | | | <i>E ochra</i> okra, vrsta zemlje oker barve. 2 <i>pisani</i> glede na vzorec kril metuljev. | |
| | | | <i>E asthenes</i> slaboten, šibak. 2 <i>čipkarček</i> glede na nežno strukturo kril in vzorca, ki spominja na čipke. | |

| | | | | |
|------|--|---------------|--|------------------------|
| 8656 | <i>A. albulata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911a | E <i>albulata</i> bel; glede na barvo kril. | beli čipkarček |
| 8658 | <i>A. anseraria</i> (Herrich-Schäffer, [1855]) | Hafner, 1911a | S <i>anserarius</i> gos, gosji; domnevno zaradi bele barve, ki spominja na barvo gosjega pečja. | gosji čipkarček |
| 8473 | <i>Baptria</i> Hübner, [1825] | Hafner, 1910 | S <i>baptros</i> obarvan, potopljen v barvo? 2 <i>črnogar</i> glede na hramilno rastlino gosenic, <i>Actea spicata</i> , črnoga. | črnogar |
| 7686 | <i>B. tibiale</i> (Esper, 1791) | Hafner, 1910 | S <i>tibialis</i> golen, noga, v obliki nogavice; po obliki bele lise na krilih. 2 <i>belolisti</i> glede na bele lise na črnih krilih. | belolisti črnogar |
| 7685 | <i>Biston</i> Leach, [1815] | Hafner, 1911b | E <i>Biston</i> Marsov sin. Brez metuljanskega pomena. 2 <i>preprogar</i> po ploskem zlaganju kril, ki so razgrnjena kot preproga. | preprogar |
| 7685 | <i>B. betularia</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>betula</i> breza; po brezi, <i>Betula</i> sp., eni od hramilnih rastlin gosenic te polifage vrste. | brezov preprogar |
| 7685 | <i>B. strataria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | E <i>stratum</i> razširjeno, razprostrto; odeja, preproga. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, <i>Quercus</i> sp., značilni hramilni rastlini gosenic. | hrastov preprogar |
| 7518 | <i>Boudinotiana</i> Leraut, 2002 | Hafner, 1910 | Jacques Boudinot (1947-1999), francoski entomolog. 2 <i>pomladin</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev. | pomladin |
| 7822 | <i>B. notha</i> (Hübner, [1803]) | Hafner, 1910 | S <i>notha</i> nezakonski; brez metuljanskega pomena. 2 <i>topolov</i> glede na topol, <i>Populus</i> sp., značilno hramilno rastlino gosenic. | topolov pomladin |
| 7822 | <i>Bupalus</i> Leach, 1815 | Hafner, 1911b | E <i>Bupalus</i> ime grškega kiparja; brez metuljanskega pomena. 2 <i>borovec</i> po boru, <i>Pinus</i> sp., značilni hramilni rastlini gosenic. | borovec |
| 7826 | <i>B. piniaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>Pinus</i> bot. rod bor, <i>Pinus</i> sp.. 2 <i>lisasti</i> glede na lisasti vzorec na krilih. | lisasti borovec |
| 7824 | <i>Cabera</i> Treitschke, 1825 | Hafner, 1911b | E <i>Cabera</i> hči Proteusa. 2 <i>belokrilnik</i> glede na mlečno bela krila vrst tega rodu. | belokrilnik |
| 7826 | <i>C. exanthemata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911b | E <i>exanthema</i> razcveteti se, izbruhniti; po razpršenih temnih pikah po krilih. 2 <i>krivočrti</i> po obliki prečnih črt na krilih. | krivočrti belokrilnik |
| 7824 | <i>C. pusaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>pusa</i> malo dekle, deklica; glede na občutljivo barvo in videz. 2 <i>ravnočrti</i> po obliki prečnih črt na krilih. | ravnočrti belokrilnik |
| 7836 | <i>Campaea</i> Lamarck, 1816 | Hafner, 1911b | E <i>campe</i> ovinkanje, spreminjanje smeri? 2 <i>biserovinar</i> glede na biserovinasto barvo in lesk kril. | biserovinar |
| 8289 | <i>C. margaritaria</i> (Linnaeus, 1761) | Hafner, 1911b | E <i>margarita</i> biser, biserovina; glede na biserno belo barvo kril. 2 <i>zelenkasti</i> po zelenkastem odtenku barve kril. | zelenkasti biserovinar |
| 8289 | <i>Campogramma</i> Stephens, 1831 | Hafner, 1911a | E <i>campotus</i> naginjen, upognjen, poševen; <i>gramma</i> črta, linija; glede na ukrivljene, krive prečne črte na srednjih krilih. | krivočrtar |
| 8289 | <i>C. bilineata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | S <i>bi-</i> dva, <i>linea</i> črta; dvočrti, z dvema črtama; glede na značilni vzorec srednjih kril, z dvojno belo črto na zmanjšan robu. | dvočrti krivočrtar |

| | | | | |
|--------|--|------------------------|--|-----------------------|
| 8440 | <i>C. scripturata</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1911a | S <i>scriptura</i> pisava, spis; ki je popisan s poševnimi, krivimi črtami. | popisani krivočrtar |
| | <i>Catulyssme</i> Hübner, [1825] | | D <i>katalchysmos</i> povodenj, potop; preplavljen z valovi, kodreki; glede na skodrane valovite črte, ki prekrivajo celotna krila. | skodranček |
| 8224 | <i>C. riguata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | S <i>riguus</i> vodnat; glede na valovite črte na krilih, ki spominjajo na valovanje vode; 2 <i>grmiščni</i> glede na značilno življenjsko okolje. | grmiščni skodranček |
| 8269 | <i>Catarhoe</i> Herbulot, 1951 | Hafner, 1911a | E <i>kata-tukaj?</i> ; nedoločna predpona; <i>rhoë</i> tok, tokovnica; glede na vijugave črte na krilih, ki spominjajo na vijugavi vodni tok. | vijugar |
| 8268 | <i>C. cucullata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911a | E <i>cucullus, cucullata</i> kapuca, kapuceast? 2 <i>rjavkastí</i> glede na rjavkasti trak v zgornjem delu srednjega krila. | rjavkasti vijugar |
| 7594 | <i>Cepphis</i> Hübner, [1823] | Hafner, 1911b | E <i>rubidatus</i> rdeč, rdečkast; "rdeča preproga"; glede na rdečkaste prečne pasove na srednjih krilih. | rdečkasti vijugar |
| | <i>C. advenaria</i> (Hübner, [1790]) | | E <i>kepphos</i> morska ptica; brez metuljarskega pomena. 2 <i>borovničar</i> glede na borovnico, <i>Vaccinium myrtillus</i> , eno od hranilnih rastlin. | borovničar |
| | <i>Charissa</i> Curtis, 1826 | | E <i>advena</i> prišlek, tujec; domnevno, ker so Hübnerju pošiljali metulje iz raznih krajev. 2 <i>nazobčani</i> glede na zobce na robu kril. | nazobljeni borovničar |
| 7862 | <i>C. ambigua</i> (Duponchel, 1830) | Hafner, 1911b | <i>Charissa</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>skalar</i> zaradi značilnega posedanja po skalah ali kamenju. | skalar |
| 7878 | <i>C. glaucinaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1911b | E <i>ambigus</i> dvomljiv, negotov; glede na težavno določitev. 2 <i>visokogorski</i> po življenju v visokogorju do 2600 m visoko. | visokogorski skalar |
| 07859a | <i>C. graecaria</i> (Staudinger, 1871) | Lasan, 2000 | E <i>glaucaus</i> modrosiv, modrikast; glede na značilno barvo kril. | modrikasti skalar |
| 7875 | <i>C. intermedia</i> (Wehrli, 1917) | Habeler & Gomboc, 2005 | S <i>graecarius</i> grški, glede na območje pojavljanja. 2 <i>balkanski</i> glede na geografsko razširjenost. | balkanski skalar |
| 7857 | <i>C. obscurata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911b | D <i>intermedius</i> srednji, vmesni; glede na vmesne taksonomske znake. 2 <i>črnočrti</i> glede na barvo prečnih črt na krilih. | črnočrti skalar |
| 7870 | <i>C. pullata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911b | E <i>obscurus</i> temni, mračnijaški. 2 <i>raznoliti</i> glede na raznoliko obarvanost primerkov te vrste. | raznoliki skalar |
| 7876 | <i>C. supinaria</i> (Mann, 1854) | Hafner, 1911b | E <i>pullus</i> temno obarvan, temni. 2 <i>temni</i> glede na pretežno temno obarvane primerke te vrste. | temni skalar |
| 7880 | <i>C. variegata</i> (Duponchel, 1830) | Hafner, 1911b | D <i>supinare</i> prevratati, obrniti; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>južni</i> glede na geografsko razširjenost v južni Evropi. | južni skalar |
| | <i>Chesias</i> Treitschke, 1825 | | E <i>variegatus</i> pisan, pester; glede na vzorec kril. | pisani skalar |
| | | | E <i>Chesias</i> vzdevek Diane. 2 <i>metlar</i> glede na metlo, <i>Sarothamnus scoparius</i> , eno od hranilnih rastlin gosenic. | metlar |

| | | | | |
|------|--|-----------------------------|---|------------------------|
| 8609 | <i>C. legatella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Carnelutti et al., 1965 | E <i>legatus</i> ambasador, guverner. 2 <i>jesenski</i> glede na značilni letni čas pojavljanja metuljev. | jesenski metlar |
| 8610 | <i>C. rufata</i> (Fabricius, 1775) | Hafner, 1910 | E <i>rufus</i> rdeč; glede na rdečerjavi preliv na srednjih krilih. 2 <i>pomladni</i> glede na značilni letni čas pojavljanja metuljev. | pomladni metlar |
| 7549 | <i>Chiasmia</i> Hübner, [1823] | | D <i>chiasma</i> križišče, stikališče. 2 <i>mrežarček</i> glede na mrežasti vzorec na krilih. | mrežarček |
| 7547 | <i>C. aestimaria</i> (Hübner, [1809]) | Carnelutti & Michieli, 1960 | S <i>aestimatus</i> cenjeni, vredni; nejasni metaljarski pomen. 2 <i>tamanišni</i> po tamariši, <i>Tamarix</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | tamanišni mrežarček |
| 7983 | <i>C. clathrata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>clathratus</i> opremiljen z mrežo, rešetko. 2 <i>travniški</i> glede na značilno življenjsko okolje. | travniški mrežarček |
| 7982 | <i>Chlorissa</i> Stephens, 1831 | | E <i>chloros</i> svetlo zelen; glede na barvo kril metuljev. | zelenček |
| 8342 | <i>C. chloraria</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1910 | E <i>chloraria</i> , <i>chloraria</i> , <i>chloros</i> svetlo zelen. 2 <i>gozdni</i> glede na življenjsko okolje. | gozdni zelenček |
| 8341 | <i>C. viridata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>viridis</i> zelen, glede na barvo kril. 2 <i>stepski</i> glede na življenjsko okolje. | stepski zelenček |
| 8601 | <i>Chloroclystis</i> Hübner, [1825] | | E <i>chloros</i> zelenorumen; <i>kluzo</i> izprani; zaradi zelene barve, ki kmalu zbledi. 2 <i>olivar</i> glede na olivnozeleno osnovno barvo kril. | olivar |
| 8342 | <i>C. miata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | S <i>mi-</i> grška črka mi; glede na belo znamenje v obliki črke <i>mi</i> na srednjih krilih? 2 glede na svetlosivo barvo zadnjih kril. | svetli olivar |
| 8341 | <i>C. siterata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911a | E <i>siteros</i> koruzast; glede na koruzo, ki je sprva zelena, ob zrelosti pa porumeni, zbledi. 2 <i>temni</i> glede na temnosivo barvo zadnjih kril. | temni olivar |
| 8601 | <i>Chloroclystis</i> Hübner, [1825] | | E <i>chloros</i> svetlo zelen, <i>kluzi kluzosprati</i> , oprati; glede na minljivo obarvanost vrst tega rodu. | zelenkar |
| 8350 | <i>C. v-ata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911a | E <i>v-ata</i> v-jast. 2 <i>črnolisi</i> glede na črno znamenje v obliki črke "v" na krilih. | črnolisi zelenkar |
| 8350 | <i>Cidaria</i> Treitschke, 1825 | | E vzdevek Cereše, boginje poljedelstva; brez metaljarskega pomena. 2 <i>gizdalinček</i> zaradi izredno lepe barve in vzorca kril. | gizdalinček |
| 7773 | <i>C. fulvata</i> (Forster, 1771) | Hafner, 1910 | E <i>fulvus</i> rjavorumen. 2 <i>rumenkasti</i> po osnovni barvi kril. | rumenkasti gizdalinček |
| 7773 | <i>Cleora</i> Curtis, 1825 | | E <i>Cleora</i> grško žensko ime, sijaj, slava; brez metaljarskega pomena. 2 <i>obročar</i> glede na beli prvi trupni segment. | obročar |
| 7773 | <i>C. cinctaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911b | E <i>cinctus</i> pas, obroč; glede na beli prvi segment trupa - pas ali obroč. | belopasi obročar |
| 7773 | <i>Cleorodes</i> Warren, 1894 | | E <i>Cleora</i> grško žensko ime; <i>eidos</i> podoben, ki je podoben <i>Cleori</i> . 2 <i>lišajar</i> glede na lišaje, značilne hranilne rastline gosenic. | lišajar |

| | | | | |
|--------|---|-------------------|---|----------------------|
| 7790 | <i>C. lichenaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | <i>E. lychen</i> lišaj, hranilna rastlina gosenic. 2 <i>zjavkasti</i> glede na osnovno barvo kril. | jvavkasti lišajar |
| | <i>Coenocalpe</i> Hübner, [1825] | | <i>E. koinos</i> skupen, <i>kalpis</i> žila; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>zemljevidar</i> po črtah na krilih, ki spominjajo na izohipse na zemljevidu. | zemljevidar |
| 8397 | <i>C. lapidata</i> (Hübner, [1809]) | Hafner, 1911a | <i>E. lapis</i> , <i>lapidis</i> kamen; po barvi kril, ki spominjajo na kamnino peščenjak. 2 <i>bledi</i> glede na bledo barvo kril. | bledi zemljevidar |
| | <i>Coenotephria</i> Prout, 1914 | | <i>E. coinos</i> skupen; <i>tephra</i> pepelnat; glede na to, da ima pepelnato barvo kot jo imajo tudi drugi metulji rodu <i>Entephria</i> . | pepelar |
| 08322b | <i>C. ablutaria</i> (Boisduval, 1840) | Hafner, 1911a | <i>S. ablutus</i> spran, obledel; glede na svetli neizraziti vzorec kril. | bledi pepelar |
| 8321 | <i>C. salicata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>S. salix salicis</i> bot. rod <i>Salix</i> , vrba; glede na domnevne hranilne rastline gosenic. | vrbov pepelar |
| 8322 | <i>C. topiaceata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>S. topiaceus</i> tuf, lehnjak. 2 <i>naskalni</i> glede na petrofilni značaj te submontanske vrste. | naskalni pepelar |
| | <i>Colostygia</i> Hübner, [1825] | | <i>E. kolos</i> zakrnel; <i>Stugios</i> reka Styx? 2 <i>lakotar</i> po lakoti, <i>Galium</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic tega rodu. | lakotar |
| 8370 | <i>C. aptata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>S. aptatus</i> prilagojen, primeren; glede na primerjavo s sorodnimi vrstami. 2 <i>gorski</i> glede na življenje v gorskem okolju. | gorski lakotar |
| 8374 | <i>C. aqueata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>S. aqueus</i> iz vode obstoječ, voden. 2 <i>obledeli</i> glede na izprano, obledelo barvo kril metuljev. | obledeli lakotar |
| 8381 | <i>C. austriacaria</i> (Herrich-Schäffer, [1852]) | Hafner, 1911a | <i>S. austriacus</i> avstrijski, iz Avstrije; glede na območje pojavljanja. 2 <i>naskalni</i> glede na petrofilni značaj metuljev te vrste. | naskalni lakotar |
| 8379 | <i>C. kollaria</i> (Herrich-Schäffer, [1848]) | Hafner, 1911a | E. V. Kollar (1797-1860), dumajski entomolog. 2 <i>špajkin</i> glede špajko, <i>Valeriana</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | špajkin lakotar |
| 8376 | <i>C. multistrigaria</i> (Haworth, [1809]) | Carnelutti, 1971 | <i>E. multus</i> , <i>multi</i> mnogo, <i>striga</i> brazda, črta; glede na številne drobne črte in pike, na sprednjih krilih. | črčkasti lakotar |
| 8371 | <i>C. olivata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>E. oliva</i> oliva; glede na olivno zeleno osnovno barvo kril. | olivni lakotar |
| 8385 | <i>C. pectinataria</i> (Knoch, 1781) | Hafner, 1911a | <i>E. pectinatus</i> nazobljen kot glavnik, glavnikast; glede na močno nazobljene tipalnice samecv. | nazobljeni lakotar |
| 8377 | <i>C. sericeata</i> (Schwingenschuss, 1926) | Carnelutti, 1992b | <i>E. sericeus</i> svilen, svilnat; glede na svilnati videz kril. | svilnati lakotar |
| 8383 | <i>C. tempestaria</i> (Herrich-Schäffer, [1856]) | Hafner, 1911a | <i>S. tempestas</i> neurje; glede na "hitra" krila samecv. 2 <i>visokogorski</i> glede na visokogorsko življenjsko okolje, do višine 2500 m. | visokogorski lakotar |
| 8378 | <i>C. turbata</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1911a | <i>S. turbatus</i> viharan; glede na vzorec kri? 2 <i>belokriti</i> glede na izstopajoča bela zadnja krila metuljev. | belokriti lakotar |

| | <i>Colotois</i> Hübner, [1823] | | | | | | | | peresar |
|------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| 7663 | <i>C. pennaria</i> (Linnaeus, 1761) | Hafner, 1911b | | | | | | | jesenski peresar |
| | <i>Comibaena</i> Hübner, [1823] | | | | | | | | nosatč |
| 7971 | <i>C. bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | | | | | | | zeleni nosatč |
| | <i>Cosmorhoe</i> Hübner, [1825] | | | | | | | | očesar |
| 8319 | <i>C. ocellata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | | | | | | | črнопiki očesar |
| | <i>Costaconvexa</i> Agenjo, 1949 | | | | | | | | krivorob |
| 8287 | <i>C. polygrammata</i> (Borkhausen, 1794) | Carnelutti & Micheli, 1955 | | | | | | | mногоčrti krivorob |
| | <i>Crocallis</i> Treitschke, 1825 | | | | | | | | žafranar |
| 7654 | <i>C. elinguarua</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | | | | | | | svetli žafranar |
| 7652 | <i>C. tusciana</i> (Borkhausen, 1793) | Hafner, 1911b | | | | | | | temni žafranar |
| | <i>Crocota</i> Hübner, [1823] | | | | | | | | snežkar |
| 7707 | <i>C. niveata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911b | | | | | | | visokogorski snežkar |
| | <i>Cyclophora</i> Hübner, 1822 | | | | | | | | krogarček |
| 8013 | <i>C. albiocellaria</i> (Hübner, 1789) | Hafner, 1910 | | | | | | | belooki krogarček |
| 8014 | <i>C. annularia</i> (Fabricius, 1775) | Hafner, 1910 | | | | | | | obročkasti krogarček |
| 8024 | <i>C. linearia</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | | | | | | | črtasti krogarček |
| 8012 | <i>C. pendularia</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1910 | | | | | | | povešavi krogarček |

| | | | | |
|------|---|---------------|--|----------------------|
| 8019 | <i>C. porata</i> (Linnaeus, 1767) | Hafner, 1910 | <i>S pore</i> luknjica; glede na okrogle lise na sredini kril. 2 <i>lisasti</i> glede na lisasti vzorec kril. | lisasti krogarček |
| 8022 | <i>C. punctaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | <i>E punctum</i> pika; glede na to, da imajo na postdiskalnem delu kril prečne nize črnih pik. | pikasti krogarček |
| 8017 | <i>C. pupillaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | <i>E pupilla</i> zenica; glede na okroglo, zenici podobno liso na krilih. | zeničasti krogarček |
| 8020 | <i>C. quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897) | Hafner, 1910 | <i>E quercus</i> bot. rod <i>Quercus</i> , hrast; <i>mons</i> gora; po nahajališču. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, značilni hranilni rastlini gosenic. | hrastov krogarček |
| 8018 | <i>C. ruficiliaria</i> (Herrich-Schäffer, [1855]) | Hafner, 1910 | <i>E rufus</i> rdeč; <i>cilia</i> rese, resice; glede na rdeče resice na zunanjem robu kril. | rdečeresi krogarček |
| 8023 | <i>C. supuncitaria</i> (Zeller, 1847) | Hafner, 1910 | <i>S sup- sub-</i> blizu, skoraj tak kot <i>punctaria</i> ; je podoben <i>punctariji</i> vendar ima manj izrazite pike in lise. | drobnopiki krogarček |
| | <i>Deileptenia</i> Hübner, [1825] | | <i>E deile</i> popoldne, zgodnji večer; <i>pteros</i> krilo; ki leta proti večeru. | večernik |
| 7775 | <i>D. ribeata</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911b | <i>E ribeata</i> bot. rod <i>Ribes</i> ; ki pa ni dejanska hranilna rastlina gosenic te vrste. 2 <i>mahovni</i> glede na mahovom podobno barvo. | mahovni večernik |
| | <i>Dicognophos</i> Wehrli, 1951 | | <i>D di-</i> dva, dvojni, dvobarvni? 2 <i>dvo</i> barvnež glede na dvobarvni vzorec na krilih, bele lise na sivi osnovni barvi. | dvobarvnež |
| 7850 | <i>D. sartata</i> (Treitschke, 1827) | Hafner, 1911b | <i>S sartus</i> pegasti, lisasti. 2 <i>belorobi</i> glede na bele lise ob zunanjem robu kril. | belorobi dvobarvnež |
| | <i>Dyscia</i> Hübner, [1825] | | <i>E duo, da</i> dva, dve, <i>skia</i> senca; glede na temne pege na ledvenih lisah sprednjih kril. | dvolisar |
| 7929 | <i>D. raunaria</i> (Freyer, 1851) | Hafner, 1911b | <i>S raunaria</i> po nahajališču, locus typicus <i>Raunach</i> ? Ravne na Kranjskem? | pikčasti dvolisar |
| | <i>Dyssroma</i> Hübner, [1825] | | <i>D dys-</i> ne, brez, slabo; <i>stroma</i> preproga, odeja. 2 <i>golič</i> ki je brez odeje, goli; glede na samo delno obarvana krila. | golič |
| 8343 | <i>D. citrata</i> (Linnaeus, 1761) | Hafner, 1911a | <i>E citrus</i> limonovec, oranževец; drevo z oranžnimi plodovi. 2 <i>dolgotraki</i> glede na dolgi srednji trak, ki sega do spodnjega roba kril. | dolgotraki golič |
| 8348 | <i>D. truncata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911a | <i>E trunco</i> kratko pokrit, obleden; glede na kratki srednji trak, ki se navadno konča že pri okrogli pegi. | kratkotraki golič |
| | <i>Earophila</i> Stephens, 1831 | | <i>E ear-</i> pomlad, glede na letni čas pojavljanja metuljev. 2 <i>jarnik</i> glede na jaro, pomladno pojavljanje metuljev. | jarnik |
| 8309 | <i>E. badicata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | <i>E badius</i> rdečerjav; glede na barvo kril. | rdečerjavi jarnik |
| | <i>Ecliptopera</i> Waren, 1894 | | <i>E ecleipo</i> manjkati; <i>oposobraz</i> ; ki nima obraza, vzorca? 2 <i>nedotikar</i> glede na nedotiko, <i>Impatiens</i> sp., hranilno rastlino gosenic. | nedotikar |

| | | | | |
|------|--|------------------|--|----------------------|
| 8339 | <i>E. capitata</i> (Herrich-Schäffer, 1839) | Hafner, 1911a | S <i>caput</i> , <i>capitis</i> glava; glede na okrasno obarvano glavo in zadek metuljev. | okrasni nedotikar |
| 8338 | <i>E. silaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>sil-</i> rumenkasta zemlja; glede na rumenkaste luske na korenu kril. 2 <i>sivkasti</i> glede na sivo barvo glave in zadka metuljev. | sivkasti nedotikar |
| 7796 | <i>Ectropis</i> Hübner, [1825] | | E <i>ectropos</i> ki je skrenil s prave poti; glede na zavito, valovito prečno črto. 2 glede na letanje v večernem mraku. | mráčnik |
| 8368 | <i>E. crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911b | E <i>crepusculum</i> mrak, glede na letanje v mraku. 2 <i>krivočrti</i> glede na obliko črt na krilih. | krivočrti mračnik |
| 8368 | <i>Electrophaes</i> Prout, 1923 | | E <i>electron</i> svetleči, janiar; <i>phaos</i> svetloba; glede na rumenkasto rjavkasto barvo kril, ki je podobna barvi janiarja. | jantarjevec |
| 8368 | <i>E. corylata</i> (Thunberg, 1792) | Hafner, 1911a | E <i>Corylus avellana</i> bot. rod leska; ena od hranilnih rastlin gosenic te polifage vrste. | leskin jantarjevec |
| 7897 | <i>Elophos</i> Boisduval, 1840 | | E <i>elaphos</i> jelen, z jelenjim srcem - plašen? Nejasen metuljarski pomen. 2 <i>gornik</i> glede na življenjsko okolje v visokih gorah. | gornik |
| 7897 | <i>E. caelibaria</i> (Heydenreich, 1851) | Hafner, 1911b | S <i>caelebs ehelos</i> različnost spolov; zaradi različnosti spolov, samice imajo zakrnela krila. | raznospolni gornik |
| 7804 | <i>Ematurga</i> Lederer, 1853 | | E <i>emar</i> , <i>ematos</i> iz <i>hemere</i> dan; <i>ergon</i> delo; ki dela, leta, podnevi. 2 <i>resavar</i> glede na življenjsko okolje. | resavar |
| 7804 | <i>E. atomaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>atomus</i> ker so krila pokrita s termimi luskami, kot bi bila posuta z drobnim prahom. | poprašeni resavar |
| 8191 | <i>Emmitis</i> Hübner, [1825] | | E <i>emmelis</i> harmoničnost, ljubkost. 2 <i>prtilikavček</i> glede na majhnost, saj je med najmanjšimi pedicami. | prtilikavček |
| 8191 | <i>E. pygmaearia</i> (Hübner, [1809]) | | E <i>pygmaeus</i> pigmejec, prtilikavec. 2 <i>stepski</i> glede na življenjsko okolje. | stepski prtilikavček |
| 7634 | <i>Ennomos</i> Treitschke, 1825 | Hafner, 1910 | E <i>ennomos</i> pravilen, pravi, skladen z zakonom, s pravilom. 2 <i>zobkar</i> glede na značilno zobasto zaključčen zunanji rob kril. | zobkar |
| 7634 | <i>E. alniaria</i> (Linnaeus, 1758) | Carnelutti, 1971 | E <i>alniaria Alnus</i> bot. rod jelsa; po hranilni rastlini gosenic. | jelšev zobkar |
| 7632 | <i>E. autumnaria</i> (Werneburg, 1859) | Hafner, 1911b | E <i>autumnus</i> jesen, glede na letni čas pojavljanja metuljev. | jesenski zobkar |
| 7636 | <i>E. erosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911b | E <i>erosus</i> glodati, obglodati; kot bi bil zunanji rob krila obglodan. 2 <i>brezov</i> po eni od hranilnih rastlin gosenic. | brezov zobkar |
| 7635 | <i>E. fuscantaria</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911b | E <i>fuscus</i> zasenčen; glede na zasenčenost zunanjega roba kril. | zasenčeni zobkar |
| 7637 | <i>E. quercaria</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911b | E <i>Quercus</i> bot. rod hrast. Glede na značilno hranilno rastlino gosenic. 2 <i>južni</i> glede na območje razširjenosti v južni Evropi. | južni zobkar |

| | | | | |
|------|---|------------------------|--|--------------------------|
| 7633 | <i>E. quercinaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | <i>E. Quercus</i> bot. rod hrast. Glede na značilno hramilno rastlino gosenic. | hrastov zobkar |
| | <i>Entephria</i> Hübner, [1825] | | <i>E entephros</i> pepelast, glede na barvo kril; <i>pepelikar</i> glede na podobnost s sivo barvo pepelike. | pepelikar |
| 8302 | <i>E. caesiata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>E caesiata</i> modrosiv; glede na osnovno barvo kril. 2 <i>rjavkasti</i> glede na prevladujoči rjavkasti odtenek naših primerkov. | rjavkasti pepelikar |
| 8297 | <i>E. cyanata</i> (Hübner, [1809]) | Hafner, 1911a | <i>S cyanos</i> moder, modri; glede na osnovno modrosivo barvo kril. | modrikasti pepelikar |
| 8296 | <i>E. flavata</i> (Osthelder, 1929) | Habeler & Gomboc, 2005 | <i>E flavus</i> rumen. 2 <i>alpski</i> glede na razširjenost v Alpah. | alpski pepelikar |
| 8299 | <i>E. flavinctata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E flavus</i> rumen; <i>cinctatus</i> ; obročkast; glede na rumeno barvo, ki je razpršena preko osnovne sive barve. | rumenkasti pepelikar |
| 8301 | <i>E. infidiaria</i> (De La Harpe, [1853]) | Hafner, 1911a | <i>S infidus</i> nezanesljiv; glede na težavno določitev. 2 <i>zobčasti</i> glede na zobčasto notranjo črto osrednjega traku na krilih. | zobčasti pepelikar |
| 8295 | <i>E. nobilitaria</i> (Herrich-Schäffer, [1852]) | Hafner, 1911a | <i>S nobilis</i> imeniten, odličen; 2 <i>sivkasti</i> glede na osnovno sivo barvo kril. | sivkasti pepelikar |
| | <i>Epilobophora</i> Inoue, 1943 | | <i>D epi-</i> na, nad; <i>lobophora</i> kpar? 2 <i>smrdljivkar</i> po smrdljivem brinu, <i>Juniperus sabina</i> , hramilna rastlina gosenic. | smrdljivkar |
| 8673 | <i>E. sabinata</i> (Geyer, [1831]) | Štanta, 2000 | <i>E sabinata</i> se nanaša na smrdljivi brin, <i>Juniperus sabina</i> . 2 <i>primorski</i> glede na pojavljanje vrste v Sloveniji. | primorski smrdljivkar |
| | <i>Epione</i> Duponchel, 1829 | | <i>E Epione</i> žena Aesculapa, utemeljitelja medicine. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>obroblijenček</i> glede na široki zunanji rob na krilih. | obroblijenček |
| 7615 | <i>E. repandaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | <i>E repandus</i> nazaj upognjen. 2 <i>ravnocrtni</i> glede na pretežno ravno robno črto, ki se konča v konici krila. | ravnocrtni obroblijenček |
| 7616 | <i>E. vespertaria</i> (Linnaeus, 1767) | Hafner, 1911b | <i>S vespere</i> večer; večerno aktivnost metuljev. 2 <i>krivočrti</i> glede na ukrivljeno robno črto, ki se konča na sprednjem robu krila. | krivočrti obroblijenček |
| | <i>Epirrhoe</i> Hübner, [1825] | | <i>E epi-</i> nad, <i>rrhoe</i> valovi, valovite črte na krilih. 2 <i>dremotar</i> po dremoti, starejšem imenu za lakoto <i>Galium</i> sp., hramilni rastlini gosenic. | dremotar |
| 8275 | <i>E. alternata</i> (Müller, 1764) | Hafner, 1911a | <i>E alternare</i> vrsiti se, menjavati se; glede na svetle in temne črte na krilih. 2 <i>sivotraki</i> glede na sivi prečni trak na krilih. | sivotraki dremotar |
| 8279 | <i>E. galiata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>E Galium</i> bot. rod <i>lakota</i> . 2 <i>svetlorobi</i> glede na pretežno svetlo obarvani zunanji rob kril. | svetlorobi dremotar |
| 8272 | <i>E. hastulata</i> (Hübner, 1790) | Hafner, 1911a | <i>E R. Hast</i> (sredina 18. stoletja) finski entomolog, Linnejev učenec. 2 <i>obročkasti</i> glede na bele obročke na črtem zadku. | obročkasti dremotar |
| 8278 | <i>E. molluginata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>S Galium mollugo</i> bot. <i>navadna lakota</i> , značilna hramilna rastlina gosenic. | lakotni dremotar |

| | | | | |
|------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 8277 | <i>E. rivata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | E <i>rivus</i> reka, glede na valovite črte na krilih. 2 <i>belotraki</i> glede na beli prečni trak na krilih. | belotraki dremotar |
| 8274 | <i>E. tristata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | E <i>tristis</i> žalost; po črni, žalostni barvi kril. 2 <i>pikasti</i> glede na dvopiki vzorec na hrbtni strani zadka. | pikasti dremotar |
| 8444 | <i>Epirrita</i> Hübner, 1822 | | <i>Eepi-</i> nad <i>rrhoe</i> teči, teči dalje, naprej (voda). 2 <i>zimar</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev. | zimar |
| 8443 | <i>E. autumnata</i> (Borkhausen, 1794) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>autumnus</i> jesen; glede na letni čas pojavljanja metuljev. 2 <i>pozni</i> glede na pojavljanje metuljev v pozni jeseni. | pozni zimar |
| 8442 | <i>E. christyi</i> (Allen, 1906) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E W. M. Chrysti (1863-1939), britanski entomolog. 2 <i>mali</i> glede na velikost, ja najmanjši med našimi vrstami tega rodu. | mali zimar |
| 7700 | <i>E. ditutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>ditutus</i> izpran, obledeli; glede na neizrziti, bledi vzorec kril. | bledi zimar |
| 7699 | <i>Erannia</i> Hübner, [1825] | | E <i>erannus</i> ljubeč, očarjiv; 2 <i>zmrzlikar</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev, ko že zmrzuje. | zmrzlikar |
| 8654 | <i>E. ankeraria</i> (Staudinger, 1861) | Stauder, 1929 | S po R. Anker (1824 - 1901), avstrijski entomolog. 2 <i>krasčki</i> glede na območje pojavljanja v Sloveniji. | krasčki zmrzlikar |
| 8334 | <i>E. defoliaria</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911b | S <i>de-</i> od, stran; <i>folium</i> list; razlístati; glede na značilnost gosenic, da odstranijo vse listje z drevoja. 2 <i>veliki</i> glede na velikost. | veliki zmrzlikar |
| 8332 | <i>Euchoeca</i> Hübner, [1823] | | E <i>eu-</i> dobro, v redu; <i>choekhos</i> , ki je iz zemlje ali gline. | glinar |
| 8330 | <i>E. nebulata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911a | E <i>nebula</i> oblak, pooblačiti se, zasenčiti; glede na značilno barvo in vzorec kril. | zasenčeni glinar |
| 8333 | <i>Eulithis</i> Hübner, 1821 | | E <i>eulithos</i> eu-dober, v redu; <i>lithos</i> kamen; po podobnost vzorcev kril s peščenjakom. | peščenjakar |
| 7818 | <i>E. mellinata</i> (Fabricius, 1787) | Lesar, 1998b | E <i>mel</i> med, medeni; glede na medu podobno barvo. | medeni peščenjakar |
| | <i>E. populata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>Populus</i> bot. rod topol; ena od hranilnih rastlin gosenic. | topolov peščenjakar |
| | <i>E. prunata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>Prunus</i> bot. rod hruška; ena od hranilnih rastlin gosenic. | hruškin peščenjakar |
| | <i>Eumannia</i> Fletcher, 1979 | | E J. J. Mann (1804 - 1889) avstrijski entomolog. 2 <i>lišajnik</i> glede na lišaje, hranilne rastline gosenic. | lišajnik |
| | <i>E. oppositaria</i> (Mann, 1864) | Carnelutti et al., 1965 | S <i>oppositus</i> nasproten, ki se zoperstavlja; ker se ne ujema z diagnozo rodu. 2 <i>južni</i> glede na razširjenost v južni Evropi. | južni lišajnik |
| | <i>Euphyia</i> Hübner, [1825] | | E <i>Euphyia</i> boginja oblike, oblikovanja. 2 <i>vzorčar</i> se nanaša na lepo in značilno oblikovan vzorec na srednjih krilih. | vzorčar |

| | | | | |
|------|--|-----------------------------|--|---------------------|
| 8437 | <i>E. adumbraria</i> (Herrich-Schäffer, [1852]) | Hafner, 1911a | S <i>adumbratus</i> osenčen, zasenčen; glede na značilne temno sive, osenčene pasove na sprednjih krilih. | osenčeni vzorčar |
| 8435 | <i>E. biangulata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911a | S <i>bi- dva, angulus</i> kot, vogal; dvokoti, dvozobi; glede na značilni vzorec na krilih v obliki dvozobe izbokline na sredini zunanje linije. | dvozobi vzorčar |
| 8438 | <i>E. frustata</i> (Treitschke, 1828) | Hafner, 1911a | S <i>frustum</i> košček, koščkast; glede na to, da je vzorec sestavljen iz koščkov različne barve, sive, rumene in zelene. | pisani vzorčar |
| 8439 | <i>E. mesembrina</i> (Rebel, 1927) | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>Mesembrina</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>karavanski</i> glede na Karavnake, območje pojavljanja te endemne vrste. | karavanski vzorčar |
| 8436 | <i>E. unangulata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911c | E <i>un- en: angulus</i> kot, vogal; enokoti, enozobi; glede na značilni vzorec na krilih v obliki enozobe izbokline na sredini zunanje linije. | enozobi vzorčar |
| | <i>Eupithecia</i> Curtis, 1825 | | E <i>eu- v</i> redu, dobro; <i>pithex, pithekos</i> pritiklav, pritiklavce. 2 <i>sviček</i> glede na majhnost in na prevladujočo sivo barvo kril | pediček |
| 8578 | <i>E. abbreviata</i> Stephens, 1831 | Hafner, 1911a | E <i>abbreviatus</i> skrajšan, porezan; glede na kratka zadnja krila, ki so znatno krajša od sprednjih. | kratkokrili pediček |
| 8481 | <i>E. abietaria</i> (Goeze, 1781) | Hafner, 1911a | E <i>Picea abies</i> glede na hramilno rastlino, smreko, kjer se gosenice hranijo s storži. | smrekov pediček |
| 8527 | <i>E. absinthiata</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911a | E <i>Arthemisia absinthium</i> , pelin; po pelinu, <i>Arthemisia absinthium</i> , eni od mnogih hramilnih rastlin te polifage vrste. | pelinov pediček |
| 8515 | <i>E. actaeata</i> Walderdorff, 1869 | Hafner, 1911a | S <i>Actaea</i> bot. rod črnoga; značilna hramilna rastlina. 2 <i>belopiki</i> glede na belo piko v spodnjem zunanjem delu sprednjega krila. | belopiki pediček |
| 8505 | <i>E. alliardia</i> Staudinger, 1870 | Lesan, 1997 | S <i>altium</i> čebula, luk, česen. Po <i>luku, Allium</i> sp., značilni hramilni rastlini, na kateri se gosenice hranijo s semeni. | lukov pediček |
| 8482 | <i>E. analoga</i> Djakonov, 1926 | Carnelutti, 1992a | D <i>analogos</i> skladnost, sorazmernost; nejasen metuljarski pomen; 2 <i>šiškin</i> gosenica živi v šiškah na smreki ali jelki. | šiškin pediček |
| 8531 | <i>E. assimilata</i> Doubleday, 1856 | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>assimilis</i> podoben, je podoben zadnji vrsti. 2 <i>hmeljev</i> glede na hmelj, <i>Humulus lupulus</i> , značilno hramilno rastlino gosenice. | hmeljev pediček |
| 8501 | <i>E. carpophagata</i> Staudinger, 1871 | Hafner, 1911a | S <i>carpophagos</i> tisti, ki žre semena. 2 <i>lepničin</i> po kammokrečni lepnici, <i>Silene saxifraga</i> , hramilni rastlini gosenice te gorske vrste. | lepničin pediček |
| 8523 | <i>E. cauchiata</i> (Duponchel, [1831]) | Hafner, 1911a | E <i>kaikhé</i> bahati se, ponašati se. 2 <i>nebinin</i> po nebinu, <i>Aster</i> sp., značilni hramilni rastlini gosenice te gorske vrste. | nebinin pediček |
| 8509 | <i>E. centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>Centaurea</i> bot. rod glavincev; <i>glavinčev</i> glede na različne vrste hramilnih rastlin gosenic iz rodu glavincev. | glavinčev pediček |
| 8521 | <i>E. cretaceata</i> (Packard, 1874) | Hafner, 1911a | E <i>cretaceus</i> apneni, ki živi na apnenecu; je tudi apneno bele barve po kateri se loči od <i>E. veratraria</i> , ki je siva in tudi živi na čmeriki. | apneni pediček |
| 8480 | <i>E. cucullaria</i> (Rebel, 1901) | Hafner, 1911a | E. <i>cucullus</i> kapuca, čepica? Nejasen metuljarski pomen. 2 <i>sredozemski</i> glede na razširjenost v vzhodnem Sredozemlju. | sredozemski pediček |

| | | | | |
|------|--|-----------------------------|--|--------------------|
| 8536 | <i>E. denotata</i> (Hübner, [1813]) | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>E. denotatus</i> razločen, jasen, označen. 2 <i>repičev</i> po repušu, <i>Phyteuma</i> sp., eni od hranilni rastlini gosenic te vrste. | repušev pediček |
| 8556 | <i>E. distinctaria</i> Herrich-Schäffer, [1848] | Hafner, 1911a | <i>E. distinctus</i> razločen, jasen. 2 <i>timijanov</i> po timijanu, <i>Thymus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | timijanov pediček |
| 8579 | <i>E. dodoneata</i> Guenée, [1858] | Carnelutti, 1992a | E Dodona, mesto v Grčiji s stariim svetim hrastom. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, <i>Quercus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | hrastov pediček |
| 8554 | <i>E. druentiata</i> Dietze, 1902 | Carnelutti & Michieli, 1955 | E D. Drury britanski entomolog (1752-1803). 2 <i>južni</i> glede na razširjenost v gorah južne Evrope. | južni pediček |
| 8507 | <i>E. egenaria</i> Herrich-Schäffer, [1848] | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>E. egenus</i> reven, ubožen; glede na neizrazit vzorec. 2 <i>lipov</i> po lipi, <i>Tilia</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | lipov pediček |
| 8585 | <i>E. ericeata</i> (Rambur, 1833) | Hafner, 1911a | <i>S. Erica arborea</i> hranilna rastlina; <i>resina</i> po resi, <i>Erica arborea</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | resin pediček |
| 8491 | <i>E. exigua</i> (Hübner, [1813]) | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>E. exiguus</i> zelo majhen. 2 <i>kovačnikov</i> glede na kovačnik <i>Lonicera</i> sp. eno od hranilnih rastlin te polifage vrste. | kovačnikov pediček |
| 8530 | <i>E. expallidata</i> Doubleday, 1856 | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>E. expallidus</i> izredno blede, svetlo; glede na blede osnovno barvo krlj. | bledi pediček |
| 8508 | <i>E. extraversaria</i> Herrich-Schäffer, [1852] | Hafner, 1911a | <i>S. extra</i> iz, izredno; izredno obličen; glede na vzorec. 2 <i>rebrinčev</i> po rebrincu, <i>Peucedanum</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic. | rebrinčev pediček |
| 8558 | <i>E. gemellata</i> Herrich-Schäffer, 1861 | Hafner, 1911a | <i>S. gemellus</i> dvojni; glede na dvojno prečno črto. 2 <i>haljičin</i> po haljici, <i>Petrorhagia</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | haljičin pediček |
| 8528 | <i>E. goossensata</i> Mabilie, 1869 | Hafner, 1911a | E T. Goossens (1827 - 1889), francoski naravoslovec. 2 <i>vrstin</i> po vrsti, <i>Calluna vulgaris</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | vrstin pediček |
| 8560 | <i>E. graphata</i> (Treitschke, 1828) | Carnelutti, 1992a | <i>E. graphos</i> pisanje, znamenje; <i>pisani</i> glede na vzorec na krilih. | pisani pediček |
| 8512 | <i>E. gratiosata</i> Herrich-Schäffer, 1861 | Carnelutti et al., 1965 | <i>S. gratiosus</i> prijeten, privlačen. 2 <i>dežnov</i> po dežnu, <i>Heracleum</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic. | dežnov pediček |
| 8511 | <i>E. gueneata</i> Milliere, 1862 | Hafner, 1911a | E A. Guenee (1809 - 1880) francoski entomolog. 2 <i>rdečkasti</i> glede na rdečkasto barvo večjega dela sprednjih krlj. | rdečkasti pediček |
| 8477 | <i>E. haworthiata</i> Doubleday, 1856 | Hafner, 1911a | E A. H. Haworth (1767 - 1833), britanski entomolog. 2 <i>srobotov</i> glede na srobot, <i>Clematis</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | srobotov pediček |
| 8538 | <i>E. icterata</i> (De Villers, 1789) | Hafner, 1911a | <i>E. icteros</i> , <i>icterus</i> rumena ptica, zlatenica. 2 <i>rjavkasti</i> po značilni barvi krlj (naši primerki so pretežno rjavi do sivi, ne pa rumeni). | rjavkasti pediček |
| 8478 | <i>E. immundata</i> (Lienig & Zeller, 1846) | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>E. immundus</i> nejsjen; glede na nejasen vzorec na krilih. 2 <i>črnogin</i> glede na črnogo, <i>Actaea spicata</i> , hranilno rastlino gosenic. | črnogin pediček |
| 8541 | <i>E. impurata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E. impurus</i> nečist, umazan; glede na zabrisan vzorec krlj. 2 <i>zvončičin</i> po zvončici, <i>Campanula</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | zvončičin pediček |

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------|--|----------------------|
| 8565 | <i>E. indigata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E. indiges</i> reveni; glede na neizravni vzorec. 2 borov glede na bor, <i>Pinus</i> sp., eno od hranilnih rastlin gosenic te polifage vrste. | borov pedicek |
| 8573 | <i>E. innotata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911a | <i>E. innotatus</i> neoznačen, nepoudarjen. 2 <i>irnov</i> glede na črni trn, <i>Prunus spinosa</i> , eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic. | trnov pedicek |
| 8493 | <i>E. insigniata</i> (Hübner, 1790) | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>E. insignis</i> zaznamovan, označen. 2 <i>sadni</i> glede na razne vrste sadnega drevja, ki so hranilne rastline gosenic te polifage vrste. | sadni pedicek |
| 8519 | <i>E. intricata</i> (Zetterstedt, 1839) | Hafner, 1911a | <i>E. intricatus</i> zamotan, težaven. 2 <i>drobnočrti</i> po velikem številu drobnih črt in lis na krilih. | drobnočrti pedicek |
| 8476 | <i>E. inturbata</i> (Hübner, [1817]) | Carnelutti, 1992a | <i>E. inturbatus</i> ki ni zmeden, je urejen. 2 <i>javorov</i> glede na javor, <i>Acer</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | javorov pedicek |
| 8490 | <i>E. irriguata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E. irriguatus</i> valoviti; glede na valovite črte na krilih. 2 <i>gradnov</i> po gradnu, <i>Quercus petraea</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | gradnov pedicek |
| 8592 | <i>E. lanceata</i> (Hübner, [1825]) | Hafner, 1911a | <i>E. lancea</i> svetla sulica, kopje; glede na dolga in koničasta krila. | koničasti pedicek |
| 8486 | <i>E. laquearia</i> Herrich-Schäffer, [1848] | Hafner, 1911a | <i>S. laquear</i> namizni prt, prekrit s prtom? glede na vzorec. 2 <i>smetlikin</i> po smetliki, <i>Euphrasia</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | smetlikin pedicek |
| 8595 | <i>E. lariciata</i> (Freyer, [1841]) | Hafner, 1911a | <i>E. Larix</i> bot. rod maceseni; po macesnu, <i>Larix decidua</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | macesnov pedicek |
| 8483 | <i>E. linariata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>E. Linaria</i> bot. rod madronščica, <i>Linaria</i> sp., značilna hranilna rastlina gosenic, ki se hranijo s cvetovi in semeni v semenskih glavcih. | madronščičin pedicek |
| 08597b | <i>E. mamiaria</i> Herrich-Schäffer, 1848 | Carnelutti, 1992b | <i>E. J. J. Mann</i> (1804 - 1889) avstrijski entomolog. 2 <i>velepiki</i> glede na veliko črno diskalno liso na srednjih kril. | velepiki pedicek |
| 8551 | <i>E. millefoliata</i> Rössler, 1866 | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>E. Achillea millefolium</i> rman; po rmanu, značilni hranilni rastlini gosenic te monofage vrste. | rmanov pedicek |
| 8570 | <i>E. nanata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E. namus</i> zelo majhen, pritlikav. 2 <i>drobni</i> glede na velikost, saj je ena najmanjših vrst tega rodu. | drobni pedicek |
| 8574 | <i>E. ochridata</i> Schütze & Pinker, 1968 | Lasan, 2000 | <i>Ohridski</i> , glede na nahajališče v okolici Ohridskega jezera v Makedoniji. | makedonski pedicek |
| 8543 | <i>E. orphnata</i> Petersen, 1910 | Deutsch, 2019 | <i>S. orphnos</i> temni, mračni; glede na obarvanost. 2 <i>skrklin</i> glede na skrko, <i>Picris</i> sp., eno od hranilnih rastlin gosenic. | skrklin pedicek |
| 8587 | <i>E. oxycedrata</i> (Rambur, 1833) | Lesan, 2000 | <i>S. Juniperus oxycedrus</i> rdečepločni brin; značilna hranilna rastlina gosenic. 2 <i>skorjasti</i> glede na vzorec temnih črt in prog na krilih. | skorjasti pedicek |
| 8568 | <i>E. pauxillaria</i> Boisduval, 1840 | Hafner, 1911a | <i>S. pauxillus</i> zelo majhen; glede na velikost. 2 <i>zobnični</i> po zobnici, <i>Odontites</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | zobnični pedicek |
| 8525 | <i>E. pernotata</i> Guenée, [1858] | Lesan, 1997 | <i>E. per-</i> po, preko; <i>nota</i> znak, znamenje. 2 <i>pikasti</i> glede na prečne črte na krilu, ki so deljene v kratke odseke ali pike. | pikasti pedicek |

| | | | | |
|--------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 8567 | <i>E. pimpinellata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E. Pimpinella saxifraga</i> navadni bedrenec. 2 po navadnem bedrencu, značilni hranilni rastlini gosenic. | bedrenčev pediček |
| 8479 | <i>E. plumbcolata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911a | <i>E. plumbcolata</i> svinčev; glede na svinčeno sivo barvo. 2 črnilčev glede na hranilno rastlino gosenic, črnilček <i>Melampyrum</i> sp. | črnilčev pediček |
| 8484 | <i>E. pulchellata</i> Stephens, 1831 | Carnelutti, 1992a | <i>E. pulchellata</i> čeden. ljubki matček; glede na vzorec krlj. 2 <i>naprstečev</i> po naprstecu, <i>Digitalis</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | naprstčev pediček |
| 8583 | <i>E. pusillata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911a | <i>E. pusillata</i> zelo majhen, droben. 2 <i>brinov</i> po brinu, <i>Juniperus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | brinov pediček |
| 8485 | <i>E. pyreneata</i> Mabilie, 1871 | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>S. pyreneus</i> pirenejski, po nahajališču v Pirenejih. | pirenejski pediček |
| 08560a | <i>E. riparia</i> Herrich-Schäffler, [1852] | Lesan, 2000 | <i>S. ripa</i> obala, obrežje, po nahajališču na obali pri Reki (Hrvaška). 2 <i>jadranski</i> glede na pretežno območje razširjenosti. | jadranski pediček |
| 8526 | <i>E. sabyrata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E. sabyrata</i> satir, gozdno božanstvo; brez metuljarskega pomena. 2 <i>gozdni</i> glede na pretežno življenjsko okolje. | gozdni pediček |
| 8503 | <i>E. schieffereri</i> Bohatsch, 1893 | Carnelutti, 1989 | S. M. Schiefferer (1828 - 1902) avstrijski entomolog. 2 <i>sredozemski</i> glede na geografsko območje razširjenosti. | sredozemski pediček |
| 8516 | <i>E. selinata</i> Herrich-Schäffler, 1861 | Carnelutti & Michieli, 1955 | <i>S. Selinum</i> seljanka; po seljanki, <i>Selinum</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | seljankin pediček |
| 8547 | <i>E. semigraphata</i> Braund, [1847] | Hafner, 1911a | <i>S. semi</i> -pol, na pol, <i>grape</i> napisano, opisano. 2 <i>čobrov</i> glede na čober, <i>Calamintha</i> sp., ena od hranilnih rastlin gosenic. | čobrov pediček |
| 8499 | <i>E. silenata</i> Assmann, 1848 | Hafner, 1911a | <i>S. Silene</i> pokalica; po pokalici, <i>Silene vulgaris</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | pokalčin pediček |
| 8553 | <i>E. simplicata</i> (Haworth, [1809]) | Carnelutti, 1992a | <i>E. simplex</i> , <i>simplicis</i> enostaven; glede na enostavni vzorec krlj. | enostavni pediček |
| 8557 | <i>E. sinuosaria</i> (Eversmann, 1848) | Carnelutti, 1992a | <i>S. sinuosus</i> ovinkast, vogalast; glede na vzorec na krilih. 2 <i>metlikin</i> po metliki, <i>Chenopodium</i> sp., hranilni rastlini gosenic. | metlikin pediček |
| 8537 | <i>E. subfuscata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911a | <i>E. subfuscus</i> nekoliko senčen, mračen; glede na temnejšo barvo. 2 po bodeči neži, <i>Carlina acanthis</i> , eni od hranilnih rastlin gosenic. | nežin pediček |
| 8546 | <i>E. subumbata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911a | <i>E. sub</i> -spodaj, pod, v manjši meri; <i>umbrotus</i> senčen; manj senčen, svetlejši, glede na svetlosivkasto do belo barvo krlj. | svetlejši pediček |
| 8539 | <i>E. succenturiata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | <i>E. succenturiatus</i> v stotnijo sprejeti rekrut; novinec. 2 <i>belolisi</i> glede na značilne bele lise na sprednjih in zadnjih krilih. | belolisi pediček |
| 8596 | <i>E. tantillaria</i> Boisduval, 1840 | Hafner, 1911a | <i>E. tantillus</i> zelo mali, drobni; glede na velikost. | mali pediček |
| 8475 | <i>E. tenuata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | <i>E. tenuis</i> vitki, suhi; glede na velikost. | vitki pediček |

| | | | | |
|------|--|---------------------------|--|----------------------|
| 8535 | <i>E. tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, [1852] | Hafner, 1911a | E <i>tri-</i> , <i>punctum</i> pika; glede na zunanjo robo belo črto, ki je navadno razdeljena v tri pike. | tropiki pediček |
| 8517 | <i>E. trivignaria</i> Herrich-Schäffer, [1848] | Hafner, 1911a | E <i>tri-</i> , <i>signum</i> znamenje, znak; glede na veliko črno diskalno liso in dve črni pegi ob njej na kostalnem robu. | trolisi pediček |
| 8496 | <i>E. undata</i> (Freyer, [1840]) | Hafner, 1911a | D <i>un-</i> , <i>data</i> ? Nejasni metaljarski pomen. 2 <i>črvinkin</i> glede na črvinko, <i>Minuartia</i> sp., eno od hranilnih rastlin gosenic. | črvinkin pediček |
| 8494 | <i>E. valerianata</i> (Hübner, [1813]) | Camelutti, 1992a | E <i>Valeriana</i> sp. špajka ali baldrijan. 2 <i>špajkin</i> po zdravilni špajki, <i>Valeriana officinalis</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | špajkin pediček |
| 8502 | <i>E. venosata</i> (Fabricius, 1787) | Hafner, 1911a | E <i>venosus</i> označen z venami, žilami; glede na vzorec. 2 <i>okrašeni</i> glede na vzorec na krilih, ki je izrisan z drobnimi črnimi črtami. | okrašeni pediček |
| 8520 | <i>E. veratraria</i> Herrich-Schäffer, [1848] | Hafner, 1911a | S <i>Veratrum</i> čmerika, hranilna rastlina. 2 <i>čmerikin</i> po čmeriki, <i>Veratrum album</i> , ki je značilna hranilna rastlina gosenic. | čmerikin pediček |
| 8577 | <i>E. virgaureata</i> Doubleday, 1861 | Hafner, 1911a | S <i>Solidago virgaurea</i> zlata rozga. 2 <i>rozgin</i> po zlati rozgi, <i>Solidago virgaurea</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | rozgin pediček |
| 8534 | <i>E. vulgata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911a | E <i>vulgus</i> navaden. 2 <i>talinov</i> po talinu, <i>Thalictrum</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic. | talinov pediček |
| 8366 | <i>Eustroma</i> Hübner, [1825] | | E <i>eu-</i> dober, pravi; <i>stroma</i> nekaj kar je razgumno, prepleteno. 2 <i>prepletene</i> glede na značilni vzorec kril. | prepletene |
| | <i>E. reticulata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Camelutti & Micheli, 1955 | E <i>reticulatus</i> mrežasti; glede na značilni vzorec kril. | mrežasti prepletene |
| | <i>Fagivorina</i> Wehrli, 1943 | | <i>Fagus</i> bot. rod <i>Fagus</i> . 2 po bukvi <i>Fagus sylvatica</i> ; <i>voru</i> žreti; po bukvi (in lišajih na bukvi?), eni od hranilnih rastlin gosenic. | bukvar |
| 7792 | <i>F. arenaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | E <i>arena</i> pesek; glede na pesčeni vzorec kril. 2 <i>lisasti</i> glede na vzorec kril. | lisasti bukvar |
| | <i>Gagitodes</i> Warren, 1893 | | <i>Gagitodes</i> neznani metaljarski pomen. 2 <i>talinar</i> glede na talin, <i>Thalictrum</i> sp., ki je značilna hranilna rastlina gosenic. | talinar |
| 8468 | <i>G. sagittata</i> (Fabricius, 1787) | Hafner, 1911a | E <i>sagitta</i> puščica; glede na nazobljeno mediano liso, ki je podobna puščici. | puščasti talinar |
| | <i>Gandaritis</i> Moore, [1868] | | D <i>gamao</i> svetiti, bleščati, lesketati se; glede na značilnosti vzorca kril. | bleščavec |
| 8335 | <i>G. pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1910 | E <i>pyralis</i> plamenasti, krilato bičje, ki je živel v ognju; glede na vzorec kril, ki spominja na plamene. | plamenasti bleščavec |
| | <i>Geometra</i> Linnaeus, 1758 | | E <i>geometreo</i> meriti zemljo; glede na pednjaj oče premikanje gosenic. | pedic |
| 7969 | <i>G. papilionaria</i> Linnaeus, 1758 | Hafner, 1910 | E <i>papilio</i> metulj; glede na podobnost z dnevnimi metulji. | metuljasti pedic |

| | | | | | |
|------|---|------------------|--|---|-----------------------|
| | <i>Gerinitia</i> Leraut, 2009 | | | D <i>geraros</i> domnevno častiljiv; postaven. 2 <i>naramničar</i> po podobnosti s častniško oznako naramnico ali epoleto. | naramničar |
| 7837 | <i>G. honoraria</i> (Denis & Schiffmüller), 1775) | Camelutti, 1989 | | D <i>honor-</i> častni, častno. 2 <i>dvočrti</i> po dveh prečnih črtah na krilih. | dvočrti naramničar |
| | <i>Gnophos</i> Treitschke, 1825 | | | E <i>gnophos</i> tema, hudourni oblak. 2 <i>oblakar</i> glede na temne, mračne barve kril. | oblakar |
| 7847 | <i>G. furvata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775) | Hafner, 1911b | | E <i>furvus</i> mrak, mračni, senčni; glede na značilno barvo kril. 2 <i>veliki</i> glede na velikost, je naš največji oblakar. | veliki oblakar |
| 7848 | <i>G. obfuscata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775) | Hafner, 1911b | | E <i>obfuscus</i> zamačen; glede na sivkasto-rjavkasto barvo. | mračni oblakar |
| | <i>Gymnoscelis</i> Mabile, 1868 | | | E <i>gymnos</i> goli, <i>skelos</i> noga, bedro; glede na to, da naoleni nima srednjih ostrog. | goličnik |
| 8599 | <i>G. rufifasciata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1911a | | E <i>rufus</i> rdeč, <i>fascia</i> trak; glede na rdeči trak na srednjih krilih. | rdečetraki goličnik |
| | <i>Helionata</i> Grote & Robinson, 1866 | | | E <i>helios</i> sonce, <i>omos</i> hkrati, istočasno s soncem. 2 po detelji, <i>Trifolium</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic. | deteljar |
| 7537 | <i>H. glarearia</i> (Denis & Schiffmüller), 1775) | Hafner, 1911b | | E <i>glareosus</i> peščeni, prodnati. 2 <i>stepski</i> glede na življenjsko okolje. | stepski deteljar |
| | <i>Hemistola</i> Warren, 1893 | | | E <i>hemi</i> polovica; <i>stole</i> oblačilo; glede na tanko oluskanost kril. 2 <i>kalcedonik</i> po modro zeleni barvi kril, ki je podobna kalcedonu. | kalcedonik |
| 8000 | <i>H. chrysoptasararia</i> (Esper, [1795]) | Hafner, 1910 | | E <i>chrysoptarusus</i> kalcedonsko zeleno, <i>khrysos</i> zlato. 2 po modro zeleni prosojni barvi žlahnega kamna kalcedona. | modrikasti kalcedonik |
| | <i>Hemitheia</i> Duponchel, 1829 | | | E <i>hemitheos</i> polbog, spoštovan; brez metaljarskega pomena. 2 <i>poletnik</i> glede na letni čas pojavljanja. | poletnik |
| 7980 | <i>H. aestivaria</i> (Hübner, 1789) | Hafner, 1910 | | E <i>aestivus</i> se nanaša na poletje, poletni. 2 <i>zelenkasti</i> glede na zeleno barvo kril. | zelenkasti poletnik |
| | <i>Horisma</i> Hübner, [1825] | | | E <i>horisma</i> meja; glede na temno črto na krilih. 2 <i>srobotar</i> po srobotu, <i>Clematis vitalba</i> , značilni hranilni rastlini večine vrst tega rodu. | srobotar |
| 8407 | <i>H. aemulata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | | E <i>aemulus</i> tekmovalen, primerljiv v odnosu do drugih vrst v rodu? 2 <i>enobarvni</i> glede na vzorec kril. | enobarvni srobotar |
| 8409 | <i>H. aquata</i> (Hübner, [1813]) | Camelutti, 1992a | | E <i>aqua</i> voda; verjetno glede na krila, ki so videti kot da bi bila oprana, izprana z vodo. | izprani srobotar |
| 8408 | <i>H. calligraphata</i> (Herrich-Schäffer, 1838) | Hafner, 1911b | | E <i>kallos</i> lep, lepo; <i>graphis</i> stil, slog pisanja. 2 <i>pisani</i> glede na pisani vzorec kril. | pisani srobotar |
| 8401 | <i>H. corticata</i> (Treitschke, 1835) | Mladinov, 1980 | | E <i>cortex</i> lubje, skorja; glede na značilni vzorec kril. | skorjasti srobotar |

| | | | | |
|------|---|------------------|--|----------------------|
| 8403 | <i>H. radicularia</i> (De La Hampe, [1855]) | Carnelutti, 1989 | D <i>radix</i> korenina, korenit. 2 <i>porečni</i> glede na značilno življenjsko okolje v logih ob rekah. | porečni srobotar |
| 8402 | <i>H. tersata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>tersus</i> obrisan, čist, nejasen; <i>zabrisani</i> , glede na zabrisani, nejasen vzorec na krilih. | zabrisani srobotar |
| 8400 | <i>H. vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>Clematis vitalba</i> hranilna rastlina; po značilni hranilni rastlini gosenic. 2 <i>svetloisi</i> glede na svetle lise na krilih. | svetloisi srobotar |
| | <i>Hydrelia</i> Hübner, [1825] | | E <i>hudrelos</i> voden; vejetno po valovitih črtah na krilih. 2 <i>jelšarpo</i> jelši, <i>Alnus</i> sp., hranilni rastlini gosenic tega rodu. | jelšar |
| 8660 | <i>H. flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911a | E <i>flammeolus</i> ognjeni, plameneci. 2 <i>plamenasti</i> glede na rumeno do oranžno barvo črt in pasov na krilih. | plamenasti jelšar |
| 8661 | <i>H. sylvata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>sylvata</i> gozd, glede na značilno življenjsko okolje. | gozdni jelšar |
| | <i>Hydria</i> Hübner, 1822 | | E <i>Hydra</i> vodna kača v grški mitologiji? 2 <i>valovitež</i> glede na prevladujoče valovite črte v vzoreu kril obeh vrst. | valovitež |
| 8421 | <i>H. cervinalis</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | E <i>cervinus</i> jelen; glede na barvo, ki spominja na barvo jelena. | jelenji valovitež |
| 8423 | <i>H. undulata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>undulatus</i> nakodran, kodrasti; glede na značilni vzorec na krilih. | kodrasti valovitež |
| | <i>Hydriomena</i> Hübner, [1825] | | E <i>hudria</i> posoda za vodo; <i>meno</i> ostati? nejasen metaljarski pomen. 2 <i>vodnar</i> glede na vlažno do močvirno življenjsko okolje. | vodnar |
| 8391 | <i>H. fuscata</i> (Thunberg, 1784) | Hafner, 1911a | E <i>furca</i> dvokraka vilica; glede na čmo znamenje na sprednjih krilih, ki zaradi variabilnosti vrste ni vedno vidno. | viličasti vodnar |
| 8392 | <i>H. impluviata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>impluvium</i> zbiralnik deževnice v rimskih hišah; gosenice naj bi hodile pit vodo na taka mesta, luže. | deževni vodnar |
| 8393 | <i>H. ruberata</i> (Freyer, [1831]) | Hafner, 1911a | E <i>ruber</i> rdeč; glede na barvo kril, ki je lahko nekoliko rdečkasta, rdečerjava. | rdečkasti vodnar |
| | <i>Hylaea</i> Hübner, 1822 | | E <i>hulatos</i> ki pripadab gozdu, gozdovnik; glede na življenjsko okolje. | gozdovnik |
| 7839 | <i>H. fasciaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>fascia</i> trak; glede na širok rjavi trak na sprednjih krilih pri rjavi obliki. 2 <i>dvoobarvni</i> gozdovnik po pojavljanju rjave in zelene oblike. | dvoobarvni gozdovnik |
| | <i>Hypomecis</i> Hübner, 1821 | | E <i>hypo</i> pod, manj kot; <i>mekos</i> velikost, dolžina? 2 <i>enoličnež</i> glede na enolični sivi vzorec kril. | enoličnež |
| 7784 | <i>H. punctinalis</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911b | E <i>punctum</i> pika, lisa. 2 <i>krogasti</i> glede na bolj ali manj okroglo liso na sredini zadnjega krila, po kateri vrsto ločimo od sosednjih. | krogasti enoličnež |
| 7783 | <i>H. roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911b | E <i>Quercus</i> bot. rod <i>hrast</i> , hrastov; glede na hrast, <i>Quercus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | hrastov enoličnež |

| | <i>Hypoxystis</i> Prout, 1915 | | | | | poškropljenec |
|------|---|-------------------|--|---|--|------------------------|
| 7628 | <i>H. plaviaria</i> (Fabricius, 1787) | Carnelutti, 1971 | | <i>E. hypo</i> pod, spodaj, <i>visston</i> svetleče, zloščeno; ki je manj blesčec. 2 <i>poškropljenec</i> glede na vzorec drobnih pik in lis. | | bledi poškrplojenec |
| | <i>Idaea</i> Treitschke, 1825 | | | | | zelikarček |
| 8102 | <i>I. aureolaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | | <i>E. auratus</i> zlat, glede na zlatorumenno obarvana krila. | | zlatorumeni zelikarček |
| 8184 | <i>I. aversata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | | <i>E. aversus</i> nasprotni; po diskalni pegi, vidni tudi na spodnji strani krila. 2 <i>dvoliki</i> glede na dve formi, s širokim ali ozkim temnim pasom. | | dvolliki zelikarček |
| 8132 | <i>I. biselata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | | <i>E. bis-</i> dva, dvojni; <i>seta</i> štetiha, dlaka; glede na šope dlak na tibijah zadnjih nog samecev. | | šopasti zelikarček |
| 8164 | <i>I. camparia</i> (Herrich-Schäffer, [1852]) | Hafner, 1910 | | <i>S. Campus</i> po nahajališču? <i>E. kampe</i> upogniti se, po gibanju gosenic? Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>drobnolisi</i> glede na vzorec kril. | | drobnolisi zelikarček |
| 8186 | <i>I. degeneraria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | | <i>E. degener</i> izrojen, nevreden svoje vrste; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>temnopasi</i> glede na značilni vzorec kril. | | temnopasi zelikarček |
| 8188 | <i>I. deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847) | Hafner, 1910 | | <i>S. deversaria</i> drugačen, različen. Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>svetlokrili</i> glede na sveta krila (v primerjavi z <i>I. aversata</i>). | | svetlokrili zelikarček |
| 8136 | <i>I. ditataria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | | <i>E. ditatus</i> opran, izpran, zabrisani. 2 <i>zabrisani</i> glede na nejasni, zabrisani vzorec kril. | | zabrisani zelikarček |
| 8161 | <i>I. dimidiata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | | <i>E. dimidia</i> razdeliti v dve polovici; glede na temne lise, ki so dobro razvite samo na spodnji polovici sprednjih kril. | | temnolisi zelikarček |
| 8176 | <i>I. distinctaria</i> (Boisduval, 1840) | Hafner, 1910 | | <i>E. distinctus</i> razločen, jasen, prepoznaven; verjetno glede na <i>I. pimpinellata</i> , od katere se jasno loči. | | razločni zelikarček |
| 8129 | <i>I. elongaria</i> (Rambur, 1833) | Hafner, 1910 | | <i>S. elongus</i> podaljšan; glede na podaljšana sprednja krila. | | dolgookrili zelikarček |
| 8183 | <i>I. emarginata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | | <i>E. emarginatus</i> odvetzi, prikrajšati; se nanaša na izrezani stranski rob krila. 2 <i>krivorobi</i> glede na izrezani rob krila. | | krivorobi zelikarček |
| 8110 | <i>I. filicata</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | | <i>S. filix</i> , <i>filicis</i> prapro; domnevno po habitatu. 2 <i>klinčkov</i> po klinčku, <i>Dianthus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | | klinčkov zelikarček |
| 8103 | <i>I. flaveolaria</i> (Hübner, [1809]) | Carnelutti, 1992a | | <i>S. flavus</i> rumen; glede na značilno rumeno barvo. | | rumeni zelikarček |
| 8137 | <i>I. fuscovenosa</i> (Goeze, 1781) | Hafner, 1910 | | <i>E. fuscus</i> mračen, temni; <i>versus</i> žilnat; glede na temni pas med veno 11 (R1) in kostalnim robom. | | temnožilni zelikarček |
| 8140 | <i>I. humiliata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | | <i>E. humilis</i> majhen, skromni, nepomembni. 2 <i>temnorobi</i> glede na temni pas ob kostalnem robu. | | temnorobi zelikarček |

| | | | | |
|------|--|-------------------|--|------------------------|
| 8134 | <i>I. inquinata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | <i>E. inquinatus</i> zabrisami; glede na zabrisani vzorec. 2 <i>herbarijski</i> ker se gosence hranijo s suhimi rastlinami, tudi v herbarijih. | herbarijski zelikarček |
| 8111 | <i>I. laevigata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | <i>E. laevigo</i> prah, poprašen, s prahom posut; glede na značilno strukturo površine kril. | poprašeni zelikarček |
| 8098 | <i>I. macilentaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847) | Carnelutti, 1992a | <i>S. macilentus</i> suh, mršav; verjetno zaradi življenja na pustih, suhih travnikih. | mršavi zelikarček |
| 8120 | <i>I. mollitata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | <i>S. monile</i> ogrlica, ovrtnik; glede na obliko valovite črte v robnem delu krila, ki spominja na ogrlico iz biserov. | biseri zelikarček |
| 8104 | <i>I. muricata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | <i>E. murex</i> polž škrlatik iz katerega se pridobiva škrlatna barva. 2 <i>škrlatni</i> glede na škrlatne lise na krilih. | škrlatni zelikarček |
| 8178 | <i>I. nitidata</i> (Herrich-Schäffer, [1861]) | Hafner, 1910 | <i>E. nitidus</i> svetleč, sijoč, blesteč; glede na svetlečo, sijočo površino kril. | blesteči zelikarček |
| 8131 | <i>I. obsoletaria</i> (Rambur, 1833) | Hafner, 1910 | <i>E. obsoletus</i> star, nejasen, obrabljen; glede na nejasni, zabrisani vzorec na krilih, ki je staričkavega videza. | staričkavi zelikarček |
| 8099 | <i>I. ochrata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | <i>E. ochra</i> vrsta rumenkaste zemlje, okra; glede na barvo kril. | okraški zelikarček |
| 8168 | <i>I. pallidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | <i>E. pallidus</i> svetli, bledi, medli; <i>-ata</i> nekdanja končnica za geometridae; glede na svetlo, bledo barvo kril. | bledi zelikarček |
| 8142 | <i>I. politaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | <i>S. politus</i> polirata, gladiti, gladko; po gladkih, svetlečih luskah na krilih. | zloščeni zelikarček |
| 8185 | <i>I. rubraria</i> (Staudinger, 1901) | Hafner, 1910 | <i>S. ruber</i> rdeč, rdečkast; glede na značilno rdečkasto rjavo barvo srednjega pasu na krilih. | rumenordeči zelikarček |
| 8093 | <i>I. rufaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | <i>S. rufus</i> rdeč, rdeč; zaradi rdečkastega poprha po krilih metuljev. | rdečkasti zelikarček |
| 8107 | <i>I. rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | <i>E. rusticus</i> podeželski, preprosti, grobi; po življenjskem okolju. 2 <i>črnotraki</i> glede na prečni črni trak v srednjem delu krila. | črnotraki zelikarček |
| 8155 | <i>I. seriata</i> (Schrank, 1802) | Hafner, 1910 | <i>E. series</i> niz, veriga, vrsta; glede na vzorec sprednjih kril za katerega je značilno, da prečne črte razpadejo v niz pik. | pikasti zelikarček |
| 8097 | <i>I. sericeata</i> (Hübner, [1813]) | Carnelutti, 1992a | <i>E. sericeus</i> svilen, svilnat; glede na svilnato lesketajoča krila metuljev. | svilnati zelikarček |
| 8100 | <i>I. serpentata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | <i>E. serpens</i> kača; glede na vijugave, zavite črte na krilih. | kačasti zelikarček |
| 8187 | <i>I. straminata</i> (Borkhausen, 1794) | Hafner, 1910 | <i>E. stramen</i> slama, slamnat; glede na osnovno barvo krij metuljev. | slamnati zelikarček |
| 8167 | <i>I. subsericeata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1910 | <i>E. sub-</i> nekaj, nekoliko; <i>sericeus</i> svilen, svilnat; zaradi rahlega leska na krilih, je manj svilnat kot <i>I. sericeata</i> . | lesketavi zelikarček |

| | | | | |
|------|---|-----------------------------|--|------------------------|
| 8123 | <i>I. sylvestraria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | E. <i>sylvestris</i> gozdni; vrsta ni gozdna! Po I. Sylvestre, francoski entomolog? 2 timijanov po <i>Thymus</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic. | timijanov zelikarček |
| 8174 | <i>I. trigeminata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1910 | E. <i>trigeminus</i> trodelni, trojni; glede na postdiskalno liso, ki je razdeljena v tri dele. | trodelni zelikarček |
| 8116 | <i>I. typicata</i> (Gueneé, [1858]) | Carnelutti, 1992a | E. <i>tupeus</i> vzorec; <i>typicus</i> imeti določen vzorec, biti značilen. | značilni zelikarček |
| 7571 | <i>Isturgia</i> Hübner, [1823] | | E. <i>historgia</i> tkanje; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>metuljničar</i> po metuljnicah (Fabaceae), značilnih hranilnih rastlinah gosenic. | metuljničar |
| 7571 | <i>I. arenaccaria</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Carnelutti & Michieli, 1955 | S. <i>arenaceus</i> pesek, peščen; peščene barve. 2 <i>lucernin</i> po lucerni (<i>Medicago sativa</i>) značilna hranilna rastlina gosenic. | lucernin metuljničar |
| 7561 | <i>I. limbaria</i> (Fabricius, 1775) | Hafner, 1911b | E. <i>limbatus</i> obrobljen; glede na značilni vzorec kril. 2 <i>metlini</i> po metli (<i>Sarothamnus scoparius</i>) eni od hranilnih rastlin gosenic. | metlin metuljničar |
| 7570 | <i>I. murinaria</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Lesan, 2000 | E. <i>murinus</i> mišje barve, mišji; 2 <i>sivorjavi</i> glede na značilno barvo kril. | sivorjavi metuljničar |
| 7562 | <i>I. roraria</i> (Fabricius, [1777]) | Carnelutti, 1971 | S. <i>rorare</i> rositi, orošen? Po črnih luskah po krilih. 2 <i>košeniččin</i> po košeničici (<i>Genista</i> sp.) eni od hranilnih rastlin gosenic. | košeniččin metuljničar |
| 8002 | <i>Jodis</i> Hübner, [1823] | | E. <i>iodes</i> rjasti; glede na hitro spremembo zelenkaste barve v rjavkasto. 2 <i>obledelec</i> glede na obledelost, hitro izgubo barve. | obledelec |
| 8002 | <i>J. lactearia</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E. <i>lactus</i> mlečni; glede na mlečno belo barvo kril, ki se hitro spremeni v nežno rjavkasto. | mlečni obledelec |
| 8003 | <i>J. putata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | S. <i>puto</i> čistiti, lepšati, bleščati se; glede na čisto, bleščečo površino kril. | bleščeči obledelec |
| 8316 | <i>Lampropteryx</i> Stephens, 1831 | | E. <i>lampros</i> svetlo, svetlikajoče; glede na izrazit lesk na površini kril. | svetlikar |
| 8316 | <i>L. suffumata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911a | E. <i>sub-</i> nekoliko, nekaj; <i>fumatus</i> dimasti; glede dimasto obarvanost kril. | dimasti svetlikar |
| 7530 | <i>Ligdia</i> Guenee, [1858] | | D. <i>lugatus</i> mračen, temen; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>trdoleskar</i> po trdoleski, <i>Euonymus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | trdoleskar |
| 7530 | <i>L. adustata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911b | E. <i>adustus</i> opečen, zažgan; glede na značilni vzorec kril, temno liso na beli podlagi. | opečeni trdoleskar |
| 8639 | <i>Lithostege</i> Hübner, [1825] | | E. <i>lithos</i> kamen; <i>steges</i> streha; sive luske na krilih so videti kot kamniti strešniki; <i>kamnar</i> glede na sive "kamnite" luske na krilih. | kamnar |
| 8639 | <i>L. farinata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | E. <i>farina</i> moka; glede na mokast vzorec kril. | mokasti kamnar |
| | <i>Lobophora</i> Curtis, 1825 | | S. <i>lobos</i> krpa; <i>phoreo</i> nositi; glede na kožno krpo na hrbtini strani kril samec, tretje krilo. | krpar |

| | | | | |
|------|---|---------------------------|---|---------------------|
| 8665 | <i>L. halterata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | E <i>halter</i> utripača, telovadna ročka; po podobnosti krilne krpe z zakrnelim krilom pri dvo krilcih (Diptera). | sivi skpar |
| | <i>Lomaspilis</i> Hübner, [1825] | | E <i>loma</i> rob, meja; <i>spilos</i> umazan, z madeži; z umazanim, s črnim robom. | robkar |
| 7527 | <i>L. marginata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>margo</i> , <i>marginis</i> rob. Glede na značilni vzorec kril. | črnorobi robkar |
| | <i>Lomographa</i> Hübner, [1825] | | E <i>loma</i> rob, meja; <i>graphe</i> risanje, risba; ki je po robu porisan. 2 <i>belček</i> glede na belo osnovno barvo kril. | belček |
| 7828 | <i>L. bimaculata</i> (Fabricius, 1775) | Hafner, 1911b | E <i>bi-</i> dva, <i>macula</i> pega, lisa. 2 <i>dvopiki</i> glede na značilni vzorec dveh pik na kostalnem robu sprednjih kril. | dvopiki belček |
| 7829 | <i>L. tenerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911b | E <i>temero</i> umazati, onesnažiti; glede na črne lise na krilih, ki "umazažejo" belo osnovno barvo. | lisasti belček |
| | <i>Lycia</i> Hübner, [1825] | | E <i>Lukeitos</i> volčji, ima dlako kakor volk; volčič. | volčič |
| 7675 | <i>L. alpina</i> (Sulzer, 1776) | Hafner, 1911b | S Alpe, alpski; se nanaša na gorovje v Evropi; glede na geografsko območje razširjenosti. | alpski volčič |
| 7677 | <i>L. florentina</i> (Stefanelli, 1882) | Camelutti, 1992a | D <i>Florentia</i> zgodovinska pokrajina v srednji Italiji, Toscana. 2 glede na pojavljanje v visokogorskem pasu. | visokogorski volčič |
| 7676 | <i>L. graecarius</i> (Staudinger, 1861) | Hafner, 1911b | S <i>graecarius</i> grški; glede na območje pojavljanja. 2 <i>južni</i> glede na razširjenost v južni Evropi. | južni volčič |
| 7674 | <i>L. hirtaria</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911b | E <i>hirtus</i> dlakavi, kocinasti; glede na izrazito dlakavost telesa. | dlakavi volčič |
| 7679 | <i>L. isabellae</i> (Harrison, 1914) | Sukič & Kodran, 2007 | S <i>Isabella</i> žensko ime; brez metuljarskega pomena. 2 <i>macesnov</i> glede na <i>Larix</i> sp., značilno hranilno rastlino. | macesnov volčič |
| | <i>Lyrtria</i> Hübner, [1823] | | S <i>lathron</i> kri, stjena kri; glede na barvo kril metuljev. 2 <i>škratnik</i> glede na škratlo barvo vzorca na krilih. | škratnik |
| 8222 | <i>L. cruentaria</i> (Hufnagel, 1767) | Camelutti, 1992a | S <i>cruentus</i> s krvavimi madeži, krvav. 2 <i>kislčin</i> glede na kislco, <i>Rumex</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | kislčin škrlatnik |
| 8221 | <i>L. purpuraria</i> (Linnaeus, 1758) | Camelutti & Micheli, 1955 | E <i>porpureus</i> purpurne barve. 2 <i>dresnin</i> glede na dresen, <i>Polygonum</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | dresnin škrlatnik |
| | <i>Macaria</i> Curtis, 1826 | | D <i>macarios</i> , <i>makar</i> srečen, blažen; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>vogalar</i> glede na izvihan vrh krila, ki poudarja vogal. | vogalar |
| 7540 | <i>M. alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911b | E <i>alternus</i> sprememba, izmenjavanje; glede na značilnosti vzorca kril da se izmenjujejo termi in svetli prečni pasovi. | premenjalni vogalar |
| 7544 | <i>M. artesiaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911b | S <i>Artois</i> grofija v Franciji; neznani metuljarski pomen. 2 <i>obrežni</i> glede na življenjsko okolje v logih ob rekah. | obrežni vogalar |

| | | | | |
|------|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| 7567 | <i>M. brunneata</i> (Thunberg, 1784) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>brunneus</i> rjav, rjavkast; glede na svetlo rjavo barvo. | rjavkasti vogalar |
| 7588 | <i>M. fuscus</i> (Thunberg, 1792) | Hafner, 1911b | E <i>fuscus</i> senčen, mračen; glede na barvo. 2 <i>sivkasti</i> glede na temno sivkasto barvo kril. | sivkasti vogalar |
| 7542 | <i>M. liturata</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911b | E <i>litura</i> madež, umazati. 2 <i>rumenolisi</i> glede na značilno rumeno liso v vogalnem delu krila. | rumenolisi vogalar |
| 7539 | <i>M. notata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>nota</i> znak, črka; glede na značilno temno piko v sredini obrobnega pasu. | velepiki vogalar |
| 7541 | <i>M. signaria</i> (Hübner, [1809]) | Hafner, 1911b | E <i>signum</i> znak, znamenje. 2 <i>smrekov</i> po življenju v gorskih iglastih gozdovih, kjer se gosenice hranijo predvsem z iglicami smreke. | smrekov vogalar |
| 7543 | <i>M. wauaria</i> (Linnaeus, 1758) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>vai</i> - ime črke "v". 2 <i>črnolisi</i> glede na vzorec črnih lis na krilih, ki so podobne črki "v". | črnolisi vogalar |
| 8454 | <i>Martania</i> Mironov, 2000 | | <i>Martania</i> ? neznani metaljarski pomen. 2 <i>pramenar</i> glede na prečne pramene ali rakove na srednjih krilih. | pramenar |
| | <i>M. taeniata</i> (Stephens, 1831) | Carnelutti, 1971 | E <i>taenia</i> trak, pramen. 2 <i>rjavkasti</i> glede na barvo sprednjih kril. | rjavkasti pramenar |
| 8412 | <i>Melanthia</i> Duponchel, 1829 | | E <i>melas</i> črn; <i>anthos</i> ; cvet, roža; 2 <i>grmiščar</i> glede na rgnišča in gozdne robove, ki so njegovo značilno življenjsko okolje. | grmiščar |
| 8411 | <i>M. ataudaria</i> (Freyer, 1846) | Hafner, 1911a | S <i>alauda</i> škrijavec?; brez metaljarskega pomena. 2 <i>gorski</i> glede na značilno življenjsko okolje v Alpah in Karpatih. | gorski grmiščar |
| | <i>M. procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>procella</i> deževni vihar, nevihta; glede na skupine črnih lusk, ki so "poškopljene" po beli osnovni barvi kril. | poškropljeni grmiščar |
| 7724 | <i>Menophra</i> Moore, [1887] | | E <i>mene</i> luna; <i>ophirus</i> resice; glede na obliko resic na robu kril. 2 <i>skorjar</i> po vzorcu kril, ki spominja na skorjo dreves. | skorjar |
| | <i>M. abruptaria</i> (Thunberg, 1792) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>abruptus</i> prelomljen, prekinjen; glede na prekinjeno temno liso na krilu. | temnolisi skorjar |
| 8312 | <i>Mesoleuca</i> Hübner, [1825] | | E <i>mesos</i> srednji, sredina; <i>leucos</i> beli; glede na to, da je osrednji del krila bele barve. | belinar |
| | <i>M. albicillata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | E <i>albus</i> bel; <i>cilla</i> rep?; domnevno glede na beli zadek. 2 <i>robidiin</i> glede na robido, <i>Rubus</i> sp., hranilno rastlino gosenic. | robidin belinar |
| 8465 | <i>Mesotype</i> Hübner, [1825] | | E <i>mesos</i> srednji; <i>typos</i> slika, vzorec; glede na podobnost vzorca kril z vrstami iz rodu <i>Perizoma</i> . | zeliščnik |
| 8471 | <i>M. didymata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | E <i>didymus</i> dvojen, dvoječek, v paru; glede na dvojno piko v robnem pasu. | dvopiki zeliščnik |
| | <i>M. parallelineata</i> (Retzius, 1783) | Hafner, 1911a | S <i>parallelineatus</i> z vspremnimi črtami. 2 <i>dvočrti</i> glede na značilni vzorec dveh vzporednih črt na sprednjih krilih. | dvočrti zeliščnik |

| | | | | |
|------|--|------------------|--|------------------------|
| 8470 | <i>M. verberata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911a | S verben vrvice od biča, črtasti sledovi bičanja. 2 visokogorski glede na življenjsko okolje v Alpah do 2500 m visoko. | visokogorski zeliščnik |
| | <i>Minoa</i> Treitschke, 1825 | | | mišjakar |
| 8663 | <i>M. murinata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | E <i>Minous</i> Minojec, pripadnik minojске kulture na Kreti. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>mišjak</i> glede na mišjo barvo kril. E <i>murinus</i> mišje barve; glede na barvo, ki je podobna mišji. 2 <i>rjavkasti</i> glede na osnovno barvo kril. | rjavkasti mišjakar |
| | <i>Narraga</i> Walker, 1861 | | | pelinar |
| 7556 | <i>N. fasciolaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | E <i>fascia</i> pas, trak; glede na rjave prečne pasove na krilih. | pasasti pelinar |
| | <i>Nebula</i> Bruand, 1846 | | | meglar |
| 8327 | <i>N. achromaria</i> (De La Harpe, [1853]) | Hafner, 1911a | E <i>achromos</i> brezbarvni; glede na bledo, obledelo barvo kril. 2 <i>sivkasti</i> glede na rahlo sivkasto barvo kril. | sivkasti meglar |
| 8325 | <i>N. nebulata</i> (Treitschke, 1828) | Hafner, 1911a | E <i>nebulata</i> meglen. 2 <i>rjavkasti</i> glede na rjavkasti odtenek barve kril. | rjavkasti meglar |
| | <i>Neognopharmia</i> Wehrli, 1953 | | | pustinjar |
| 7581 | <i>N. stevenaria</i> (Boisduval, 1840) | Hafner, 1911b | E <i>Steven</i> priimek? 2 <i>sivokrtli</i> glede na prevladujočo sivo barvo kril. | sivokrtli pustinjar |
| | <i>Nothocasis</i> Prout, 1936 | | | javornik |
| 8679 | <i>N. sericata</i> (Hübner, [1817]) | Hafner, 1910 | E <i>morda nothos nothie</i> ; bastard, križanec, nepravil. 2 <i>javornik</i> , po <i>Acer pseudoplatanus</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. S <i>serius</i> soditi skupaj, združiti, sortirati. 2 jesenski, glede na letni čas pojavljanja metuljev. | jesenski javornik |
| | <i>Nychiodes</i> Lederer, 1853 | | | temačnik |
| 7720 | <i>N. dalmatina</i> Wagner, 1909 | Carmelutti, 1989 | S <i>dalmatina</i> dalmatinski, glede na geografsko razširjenost. 2 <i>primorski</i> glede na območje pojavljanja v Sloveniji. | primorski temačnik |
| 7715 | <i>N. obscuraria</i> (De Villers, 1789) | Hafner, 1911b | S <i>obscurus</i> temni, nejasni. 2 <i>resizpo</i> resci. <i>Erica</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic. | resin temačnik |
| | <i>Odezia</i> Boisduval, 1840 | | | sprehajalec |
| 8631 | <i>O. atrata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>hodos</i> cesta, pot; <i>hexomaisedeti</i> ; glede na lastnost metuljev, da se radi spretavajo ob poteh in posedajo na golo zemljo. | črni sprehajalec |
| | <i>Odontognophos</i> Wehrli, 1951 | | | zobnjakar |
| | | | E <i>odous odontos</i> ; zobje, zobati; <i>gnophos</i> oblakar. 2 <i>zobnjakar</i> glede na nazobčan zunanji rob krila. | |

| | | | | |
|------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| 7852 | <i>O. dumetata</i> (Tretschke, 1827) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>dumetum</i> goščava; glede na življenjsko okolje. | goščavski zobnjakar |
| | <i>Odontopera</i> Stephens, 1831 | | E <i>odous</i> , <i>odontos</i> zob. 2 <i>dvozob</i> glede na dva izrazita zobčka na zunanjem robu krila. | dvozob |
| 7647 | <i>O. bidentata</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911b | E <i>bidens</i> ki ima dva zoba, <i>dvozob</i> , glede na značilno zobato obliko zunanjega roba kril. | temni dvozub |
| 8447 | <i>Operophtera</i> Hbner, [1825] | | E Oporophtera: <i>opora</i> sadje; <i>phitheiro</i> uničiti; uničevalec sadnega drevoja. 2 <i>mrazarček</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev. | mrazarček |
| 8448 | <i>O. brumata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>bruma</i> kratki, najkrajši; se nanaša na letni čas kratkega dne (zima); <i>hrastov</i> , glede na značilno hranilno rastlino gosenic. | hrastov mrazarček |
| | <i>O. fagata</i> (Scharfenberg, 1805) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>Fagus</i> bot. rod bukev; glede na značilno hranilno rastlino gosenic. | bukov mrazarček |
| 7613 | <i>Opisthographis</i> Hübner, [1823] | | E <i>opisthen</i> od <i>zadaj</i> , <i>graptos</i> opisovan; glede na to, da je močna rdeča pega dobro vidna tudi na zadnji strani krila. | rumenec |
| | <i>O. luteolata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>luteolus</i> rumenkasti; po značilni rumeni barvi kril. 2 <i>grmiščni</i> glede na značilno življenjsko okolje. | grmiščni rumenec |
| 8246 | <i>Orthonama</i> Hübner, [1825] | | E <i>orthos</i> raven; <i>nama</i> tok, črta; glede na razmeroma ravne prečne črte na krilih v primerjavi z vijugavimi črtami sorodnih rodov. | ravnočrtar |
| 8245 | <i>O. obstepata</i> (Fabricius, 1794) | Hafner, 1911a | E <i>obstipus</i> vreči, posipati, poštropiti. 2 <i>selivski</i> glede na migrantski značaj vrste. | selivski ravnočrtar |
| | <i>O. vittata</i> (Borkhausen, 1794) | Carnelutti et al., 1965 | E <i>vittata</i> trak, veneč. 2 <i>močvirski</i> glede na življenjsko okolje. | močvirski ravnočrtar |
| 7659 | <i>Ourapteryx</i> Leach, 1814 | | E <i>oura</i> rep, repati; <i>pterus</i> krilo; glede na obliko zadnjih kril, ki so podaljšana v rep. | repatec |
| 7609 | <i>O. sambucaria</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911b | E <i>Sambucus</i> bot. rod bezeg; po eni od hranilnih rastlin gosenic. | bezgov repatec |
| | <i>Pachynemita</i> Stephens, 1829 | | E <i>pachus</i> debel, močan, <i>kneme</i> goleni; ker je pri samcih zadnji del tibije razširjen. 2 <i>ozkokrilec</i> glede na obliko sprednjih kril. | ozkokrilec |
| 7743 | <i>P. hippocastanaria</i> (Hübner, [1799]) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E <i>Aesculus hippocastanum</i> domnevna hranilna rastlina, ki pa dejansko ni. 2 <i>krepkonogi</i> glede na razširjene goleni samcev. | krepkonogi ozkokrilec |
| | <i>Parabornia</i> Krampl, 1994 | | E <i>para</i> poleg, pri, ob, <i>bous</i> vol, <i>harmos</i> skladnost; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>lubjar</i> ker je vzorec kril podoben drevesnemu lubju. | lubjar |
| | <i>P. viertlii</i> (Bohatsch, 1883) | Habeler, 2011 | Adelbert Viertl, entomolog, 1831 - 1900. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, <i>Quercus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | hrastov lubjar |
| | <i>Paradarisa</i> Warren, 1894 | | E <i>para-</i> poleg, pri, ob; je zelo podoben orientalskemu rodu <i>Darisa</i> Moore. 2 <i>deblar</i> ker metulji radi posedajo po deblih dreves. | deblar |

| | | | | |
|------|---|---------------|---|-----------------------|
| 7798 | <i>P. consontaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1911b | E <i>consus</i> primeren, ujemajoč se; ker se vzorec na deblu sedčega metulja ujema z vzorcem debla. | gladkokrtili deblar |
| | <i>Parectropis</i> Sato, 1980 | | | mračnikar |
| 7800 | <i>P. similaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | E <i>par-</i> podoben, tak kot; glede na podobnost z rodnom <i>Ectropis</i> . 2 <i>mračnikar</i> , ker je podoben mračniku. | belolisi mračnikar |
| | <i>Pareutype</i> Herboult, 1951 | | | česminar |
| 8414 | <i>P. berberata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911a | E <i>par-</i> podoben, tak kot; podoben, soroden rodu <i>Eutype</i> . 2 <i>česminar</i> glede na česmin, <i>Berberis vulgaris</i> , hramilno rastlino gosenic. | temnočrti česminar |
| | <i>Pusiphila</i> Mayerick, 1883 | | | zelenik |
| 8604 | <i>P. chloerata</i> (Mabille, 1870) | Hafner, 1911a | E <i>berberis</i> česmin <i>Berberis</i> sp. 2 <i>temnočrti</i> glede na značilni vzorec temnih črt na krilih metuljev. | pomladni zelenik |
| 8605 | <i>P. debilitata</i> (Hübner, [1817]) | Hafner, 1911a | E <i>pascus</i> , <i>pascuata</i> pašnik, pašniški? Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>zelenik</i> glede na zelenkasto barvo krlj vrst tega rodu. | obledeleli zelenik |
| 8603 | <i>P. rectangulata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | E <i>khloe</i> svetlo zelena brava pomladi; glede na tako barvo na krilih. | pravokotniški zelenik |
| | <i>Pelturga</i> Hübner, [1825] | | | lobodar |
| 8314 | <i>P. comitata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | E <i>debilitata</i> šibkost; glede na bledo, svetlo zeleno barvo na krilih, ki hitro zbledi v rumenkasto. | glineni lobodar |
| | <i>Pennithera</i> Viidalepp, 1980 | | | borovnik |
| 8354 | <i>P. firmata</i> (Hübner, [1822]) | Hafner, 1911a | E <i>rectangulus</i> pravokotni; glede na pravokotno oblikovane pikčaste trakove na spodnji strani zadnjih krlj. | okrasti borovnik |
| | <i>Perconia</i> Hübner, [1823] | | | poprašenec |
| 7939 | <i>P. strigillaria</i> (Hübner, 1787) | Hafner, 1911b | E <i>pelourgus</i> delavec z glino, glinar; glede na barvo krlj. 2 <i>lobodar</i> po lobodi, <i>Atriplex</i> sp., značilni hramilni rastlini gosenic. | tročrti poprašenec |
| | <i>Peribatodes</i> Wehni, 1943 | | | goščavar |
| 7764 | <i>P. correptaria</i> (Zeller, 1847) | Hafner, 1911b | E <i>comitor</i> spremljajoč; ker se rad pojavlja s <i>Scotopteryx chenopodiata</i> . 2 <i>glineni</i> glede na osnovno glineno barvo krlj. | jasnočrti goščavar |
| 7754 | <i>P. rhomboidaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911b | E <i>penna pero</i> , <i>peresasi</i> ; glede na tipalnice samcev. 2 <i>borovnik</i> glede na habitat borovnih gozdov, kjer se hrani z iglicami bora <i>Pinus</i> sp. | rombasti goščavar |
| | | | E <i>firno</i> uvrstiti, potrditi; glede na variabilnost vrst in zahtevnost določanje vrst tega rodu. 2 <i>okrasti</i> glede na osnovno barvo krlj. | |
| | | | E <i>peri-</i> okrog in okrog, <i>konios</i> prah; glede na poprašeno površino krlj. | |
| | | | E <i>strigilla</i> skovanka iz <i>striga</i> brazda, črta. 2 <i>tročrti</i> glede na vzorec treh črt. | |
| | | | E <i>peri-</i> okrog, okoli; <i>batodes</i> preraščen s tmi, morda glede na habitat. 2 <i>goščavar</i> glede na gosto zaraščeno življenjsko okolje | |
| | | | E <i>correpus</i> združen, glede na potek prečnih črt. 2 <i>jasnočrti</i> glede na jasno izrisane prečne črte na krilih. | |
| | | | E <i>rhomboides</i> rombasti, po rombu podobnemu znamenju na sprednjih krilih. | |

| | | | | |
|------|---|-----------------------------|--|---------------------|
| 7762 | <i>P. secundaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911b | E <i>secundus</i> naslednji? po C. <i>Plinius Secundus</i> , avtorju <i>Naturalis historia</i> . 2 <i>mali</i> glede na velikost, saj je najmanjši v tem rodu. | mali goščavar |
| 7761 | <i>P. umbraria</i> (Hübner, [1809]) | Carnelutti & Michieli, 1960 | S <i>umbra</i> senca, osenčen; glede na osenčene, razmazane temne površine med in ob prečnih črtah. | osenčeni goščavar |
| 8455 | <i>Perizoma</i> Hübner, [1825] | | E <i>perizoma</i> pas, obseg, opasati. 2 <i>glavičar</i> ker gosenice večine vrst živijo v semenskih glavičah in se hranijo s semeni rastlin. | glavičar |
| 8463 | <i>P. affinitata</i> (Stephens, 1831) | Hafner, 1911a | E <i>affinitatus</i> soroden; po sorodnosti s <i>P. alchemillata</i> . 2 <i>pokaličin</i> glede na pokalico, <i>Silene vulgaris</i> , hranilno rastlino gosenic. | pokaličin glavičar |
| 8456 | <i>P. albulata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911a | E <i>albulus</i> belkast, bled; glede na značilno barvo krlj. | belkasti glavičar |
| 8459 | <i>P. alchemillata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | E <i>Alchemilla</i> kamilica, domnevna hranilna rastlina gosenic. 2 <i>zebratov</i> po zebnatu, <i>Galeopsis</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic. | zebratov glavičar |
| 8462 | <i>P. bifasciata</i> (Haworth, [1809]) | Carnelutti & Michieli, 1955 | E pravilno <i>bifasciata</i> ; bi- dva; <i>fascia</i> trak, pas. 2 po zobnici, <i>Odonitidis</i> sp., značilni hranilni rastlino gosenic. | zobničin glavičar |
| 8464 | <i>P. blandata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911a | E <i>blandus</i> prijeten, vesel. 2 <i>smetličin</i> glede na smetliko, <i>Euphrasia</i> sp., ki je značilna hranilna rastlina gosenic. | smetličin glavičar |
| 8469 | <i>P. flavofasciata</i> (Thunberg, 1792) | Hafner, 1911a | E <i>flavus</i> rumen; <i>fascia</i> trak, pas; glede na značilnost vzorca. | rumenopasi glavičar |
| 8457 | <i>P. hydrata</i> (Treitschke, 1829) | Hafner, 1911a | S <i>hydratus</i> vodnat, vodast; glede na valovite prečne črte na srednjih krljih. 2 po lepnetci, <i>Silene</i> sp., hranilni rastlini gosenic. | lepnetčin glavičar |
| 8468 | <i>P. incultaria</i> (Herrich-Schäffer, [1848]) | Hafner, 1911a | S <i>incultus</i> nelep, nečeden, neokrašen; glede na vzorec. | neokrašeni glavičar |
| 8458 | <i>P. lugdunaria</i> (Herrich-Schäffer, [1855]) | Carnelutti & Michieli, 1960 | S <i>Lugdunum</i> rimsko mesto, današnji Lyon; nahajališče. 2 po rokavcu, <i>Cucubalus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | rokavčev glavičar |
| 8461 | <i>P. minorata</i> (Treitschke, 1828) | Hafner, 1911a | E <i>minor</i> najmanjši; ker je najmanjša vrsta tega rodu. | najmanjši glavičar |
| 8467 | <i>P. obsoletata</i> (Herrich-Schäffer, 1838) | Hafner, 1911a | E <i>obsoletus</i> star, mračen, nejasen. 2 <i>sviščev</i> glede na to, da se gosenice hranijo s cvetovi in semeni svišča <i>Genitiana</i> sp. | sviščev glavičar |
| 7596 | <i>Petrophora</i> Hübner, [1811] | | E <i>petros</i> sklala, <i>phoreo</i> nositi; po kameni barvi trakov na krljih. 2 <i>praprotnar</i> po praprotni, <i>Pteridium</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic | praprotnar |
| 7984 | <i>P. chlorosata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911b | E <i>chloros</i> svetlozelen, rumenozelen, svetli; glede na osnovno barvo krlj. | svetli praprotnar |
| 7984 | <i>Phaioграмма</i> Stephens, 1831 | | D <i>phaeinus</i> svetel, bel, blesčec; <i>gramma</i> črta, črta; ki je svetlo porisan. 2 <i>turkiznik</i> glede na turkizno zeleno barvo krlj. | turkiznik |
| 7984 | <i>P. etruscaria</i> (Zeller, 1849) | Hafner, 1910 | <i>Etrurija</i> zgodovinska pokrajina v srednji Italiji, Toskana. 2 <i>beločrti</i> glede na vzorec belih črt. | beločrti turkiznik |

| | | | | |
|------|---|------------------|---|------------------------|
| 7904 | <i>P. alticolaria</i> Mann, 1853 | Hafner, 1911b | E <i>alti</i> visoko, <i>colo</i> stanovati; glede na življenjsko okolje, visokogorje. | visokogorski ledenikar |
| 7906 | <i>P. canaliculata</i> (Hochenwarth, 1785) | Hafner, 1911b | E <i>cana</i> slana, slanast, sivkasti; glede na barvo temnih prečnih črt na krilih. | sivkasti ledenikar |
| 7910 | <i>P. coracina</i> (Esper, 1805) | Hafner, 1911b | S <i>koras</i> krokar, vran; glede na vrano podobno barvo. | vranji ledenikar |
| 7909 | <i>P. noricana</i> Wagner, 1898 | Hafner, 1911b | S <i>Noricum</i> rimska provinca, ki je delno segala tudi na ozemlje današnje Slovenije. | noriški ledenikar |
| 7902 | <i>P. quadrifaria</i> (Sulzer, 1776) | Hafner, 1911b | S <i>quadrifarium</i> štrikraten, četverni; glede na štiri rumene lise na krilih. | rumenolisi ledenikar |
| 7905 | <i>P. spitzii</i> Rebel, 1906 | Hafner, 1911b | Robert Spitz (1859-1954) avstrijski entomolog. 2 <i>triglavski</i> glede na to, da je vrsta endemit triglavskega pogoja. | triglavski ledenikar |
| 8675 | <i>Pterapherapteryx</i> Curtis, 1825 | | E <i>pteron</i> krilo; <i>phereo</i> nositi; tisti, ki nosi krila "krilonosi krilatec". 2 <i>krilar</i> tisti, ki ima krila. | krilar |
| | <i>P. sexualata</i> (Retzius, 1783) | Hafner, 1910 | S <i>sex</i> šest; <i>ala</i> krilo; glede na velike krilne kipe na zgornji strani zadnjih kril samcev, ki delujejo kot tretji par kril. | šesterni krilar |
| 7844 | <i>Pungeleria</i> Rougemont, 1903 | | S Rudolf Pungeler (1857 - 1927) nemški lepidopterolog. 2 <i>jelkarpo</i> jelki, <i>Abies</i> sp. eni od hranilnih rastlin gosenic. | jelkar |
| | <i>P. capreolaria</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1911b | E <i>capreola</i> divja koza, gams? verjetno glede na podobno barvo. | rijavi jelkar |
| | <i>Rheumaptera</i> Hübner, 1822 | | E <i>rheuma</i> tok, reka; (podobno kot Hübnerjeve "rivulete"); <i>pteron</i> krilo. 2 <i>kopjar</i> glede na kopju podobno belo znamenje na krilu. | kopjar |
| 8419 | <i>R. hastata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | S <i>hasta</i> kopje, sulica, harpuna; glede na belo kopjasto znamenje na robu krila. 2 <i>veliki</i> glede na velikost v primerjavi z <i>R. subhastata</i> . | veliki kopjar |
| 8420 | <i>R. subhastata</i> (Noleken, 1870) | Camelutti, 1992a | E <i>sub-</i> pod, manj kot. 2 <i>mali</i> glede na velikost v primerjavi z <i>R. hastata</i> . | mali kopjar |
| 8211 | <i>Rhodometra</i> Mayentek, 1892 | | E <i>rhodon</i> roža, tudi v kompasu; <i>metro</i> meriti; morda prispodoba za potovanje. 2 <i>vandrovček</i> glede na migrantski značaj vrste. | vandrovček |
| | <i>R. saceraria</i> (Linnaeus, 1767) | Hafner, 1910 | E <i>sacer</i> sveti; se nanaša na svečnice, varuhinje templja; brez metaljarskega pomena. 2 <i>rdeččrti</i> glede na rdečo črto na krilih. | rdeččrti vandrovček |
| 8207 | <i>Rhodostrophia</i> Hübner, [1823] | | E <i>rhodon</i> roža, rožnatordeča barva; <i>strophos</i> povelj, zavoj. 2 <i>rdeččnik</i> glede na rdeče pasove, trakove na krilih. | rdeččnik |
| | <i>R. calabra</i> (Petagna, 1786) | Hafner, 1910 | S <i>calabra</i> pokrajina Kalabija; po tipičnem nahajališču. 2 <i>metlin</i> glede na metlo, <i>Sarothamnus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | metlin rdeččnik |
| 8205 | <i>R. vibicaria</i> (Clereh, 1759) | Hafner, 1910 | E <i>vibex</i> sled biča, udarca. 2 <i>pasasti</i> glede na rdeče pasove na krilih. | pasasti rdeččnik |

| | <i>Rhoptria</i> Guenee [1858] | | | <i>E rhops</i> grm, grmovje, <i>bosko</i> jesti, hraniti se. 2 <i>brškinar</i> glede na brškin, <i>Cistus</i> sp., hranilno rastlino gosenic. | brškinar |
|-------|--|-------------------|--|--|------------------------|
| 7583 | <i>R. asperaria</i> (Hübner, [1817]) | Hafner, 1911b | | <i>S asper hrapav, raskav</i> ; glede na hrapavo, raskavo popviršno kril. | raskavi brškinar |
| 8635 | <i>Schistosstege</i> Hübner, [1825] | | | <i>S shiso</i> cepiti; po značilnosti vzorca, da se pasovi na krilih žarkasto cepijo. 2 <i>mlečkar</i> po mlečku, <i>Euphorbia</i> sp., hranilni rastlini gosenic. | mlečkar |
| | <i>S. decussata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | | <i>S decusso</i> navkrižno razdeliti. 2 žarkasto razdeljeno v vse smeri, <i>žarkasti</i> glede na značilnost vzorca na krilih. | žarkasti mlečkar |
| | <i>Sciadia</i> Hübner, 1822 | | | <i>S skia</i> senca; nejasen metaljarski pomen. 2 <i>visokogornik</i> glede na življenjsko okolje v visokih gorah med 2000 in 4000 m. | visokogornik |
| 7752c | <i>S. slovenica</i> Leraut, 2008 | Leraut, 2008 | | <i>slovenski</i> glede na tipično lokaliteto Triglav in razširjenost v Sloveniji, delno tudi v Avstriji in Italiji; endemit triglavskega pogorja. | slovenski visokogornik |
| 7752 | <i>S. tenebraria</i> (Esper, [1806]) | Hafner, 1911b | | <i>E tenebrae</i> tema; <i>tenebratus</i> senčni; glede na temno, skoraj črno, barvo barvo kril. | temni visokogornik |
| 7895 | <i>S. zelleraria</i> (Freyer, [1836]) | Hafner, 1911b | | E P. C. Zeller (1808 - 1883), nemški lepidopterolog. 2 <i>alpski</i> glede na geografsko območje razširjenosti v Alpah. | alpski visokogornik |
| | <i>Scopula</i> Schrank, 1802 | | | <i>E scopula</i> mala metla, metlica; zaradi šopov lusk na hrbtini strani golenic samcev nekaterih vrst tega rodu. | metlarček |
| 8039 | <i>S. caricaria</i> (Reutti, 1853) | Hafner, 1910 | | <i>S carex, caricis</i> ; bot. rod <i>Carex</i> , šaš; po močvirnem življenjskem okolju. 2 <i>svilnati</i> glede na značilno barvo kril. | svilnati metlarček |
| 8079 | <i>S. confinaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847) | Carnelutti, 1992a | | <i>S confinis</i> sosednji, podoben, soroden. 2 <i>južni</i> glede na geografsko razširjenost v južni Evropi. | južni metlarček |
| 8038 | <i>S. corrvialaria</i> (Kretschmar, 1862) | Gomboc, 1999 | | <i>S corrvialis</i> potočni, ki pripada potoku; glede na močvirne travnike, ki so življenjsko okolje te vrste. | močvirni metlarček |
| 8051 | <i>S. decorata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | | <i>E decoratus</i> , olepšan, okašeni; glede na značilni vzorec kril. | okrašeni metlarček |
| 8072 | <i>S. emutaria</i> (Hübner, [1809]) | Carnelutti, 1971 | | <i>E emuto</i> sprememiti se; verjetno zaradi sprembe barve. 2 <i>primorski</i> glede na razširjenost v Sloveniji na obalnih slaniščih. | primorski metlarček |
| 8068 | <i>S. flaccidaria</i> (Zeller, 1852) | Hafner, 1910 | | <i>S flaccidus</i> medli, motni, kalni, brez leska. Glede na značilnosti vzorca kril. | motni metlarček |
| 8069 | <i>S. floslactata</i> (Haworth, [1809]) | Hafner, 1910 | | <i>E flos</i> cvetlica, cvet; <i>lactis</i> mlečni; glede na osnovno barvo kril. | mlečni metlarček |
| 8062 | <i>S. imitaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1910 | | <i>E imitor</i> posnemanje, oponašanje; verjetno zaradi podobnosti z vrsto <i>Timandra griseata</i> . 2 <i>okrasni</i> glede na značilno barvo. | okrasni metlarček |
| 8036 | <i>S. immorata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | | <i>S immoratus</i> ostali, preostali, ki je ostal iz rodu <i>Acidalia</i> . 2 <i>pepelasti</i> glede na pepelasto sivo barvo kril. | pepelasti metlarček |

| | | | | |
|--------|--|-----------------------|--|----------------------|
| 8064 | <i>S. immutata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>immutatus</i> nespremenljiv; glede na to, da so krila na zgornji in spodnji strani enako obarvana. | enobarvni metlarček |
| 8060 | <i>S. incanata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>incanus</i> siv, sivkast; glede na osnovno barvo kril. | sivkasti metlarček |
| 8061 | <i>S. luridata</i> (Zeller, 1847) | Hafner, 1910 | E <i>luridus</i> bledi, svetlo rumeni; glede na osnovno barvo kril. | bledi metlarček |
| 8059 | <i>S. marginepunctata</i> (Goeze, 1781) | Hafner, 1910 | E <i>margo, marginis</i> rob; <i>punctum</i> pika, pega; glede na izrazite temne pike na zunanem robu kril. | robopiki metlarček |
| 8040 | <i>S. nemoraria</i> (Hübner, [1799]) | Hoffmann & Klos, 1917 | E <i>nemus, nemoris</i> gozd, gaj; glede na življenjsko okoljke metuljev. 2 <i>beli</i> glede na barvo kril. | beli metlarček |
| 8042 | <i>S. nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | E <i>niger</i> črn, <i>punctum</i> pika; <i>črnopiki</i> glede na značilni vzorec kril. | črnopiki metlarček |
| 8045 | <i>S. ornata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | E <i>ornatus</i> okrašen, olepšan. 2 <i>Scopolijev</i> glede na Scopolija, ki je vrsto opisal po primerkih s Kranjske. | Scopolijev metlarček |
| 8054 | <i>S. rubiginata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | E <i>rubigino, rubigino</i> rjast; glede na osnovno rjasto barvo kril. | rjasti metlarček |
| 8048 | <i>S. submutata</i> (Treitschke, 1828) | Hafner, 1910 | E <i>sub-</i> pod, ob, skoraj kot; <i>mutatus</i> sprememba, spremenjen; skoraj tak, podoben kot <i>mutata</i> . 2 <i>pisani</i> glede na pisani vzorec. | pisani metlarček |
| 8070 | <i>S. subpunctaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847) | Hafner, 1910 | E <i>sub-</i> pod, ob, skoraj kot; je podoben vrsti <i>punctaria</i> . 2 <i>kremasti</i> glede na svetlo kremasto barvo kril. | kremasti metlarček |
| 8067 | <i>S. ternata</i> (Schrank, 1802) | Hafner, 1910 | E <i>termi</i> trojni, trikratni; glede na tri izrazite prečne črte na krilih. | tročrti metlarček |
| 8041 | <i>S. umbelaria</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1910 | S <i>umbella</i> pomanjševalnica od <i>umbra</i> senca; <i>senčni</i> glede na kot senca rahle prečne črte. | sivočrti metlarček |
| 8043 | <i>S. virgulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | E <i>virgulatus</i> progasti, črtasti; 2 <i>rjavočrti</i> glede na značilni vzorec kril. | rjavočrti metlarček |
| | <i>Sciopteryx</i> Hübner, [1825] | | E <i>scotos</i> tema, temačno; glede na temne, senčne barve na srednjih krilih. | temnikar |
| 8236 | <i>S. bipunctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | E <i>bi-</i> dva; <i>punctum</i> pika; glede na dve črni diskalni piki na krilih. | dvopiki temnikar |
| 8239 | <i>S. chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E <i>Chenopodium</i> bot. rod metlika; glede na hramilno rastlino gosenic. | metlikin temnikar |
| 8232 | <i>S. coarctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Hafner, 1910 | S <i>coarctos</i> zožiti se, zožen; glede na ozki osrednji trak in ozke pasove na krilih. | ozkotraki temnikar |
| 08243a | <i>S. ignorata</i> Huemer & Hausmann, 1998 | Lasan, 2000 | E <i>ignoratus</i> neznani, prezrti. Glede na to, da je bila vrsta dolgo prezrta in zelo pozno odkrita. | prezrti temnikar |

| | | | | |
|------|---|-------------------|---|---------------------|
| 8241 | <i>S. luridata</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1910 | E <i>luridus</i> blede; svetli; glede na barvo sprednjih kril. 2 <i>sivkasti</i> glede na osnovno barvo kril. | sivkasti temnikar |
| 8229 | <i>S. moeniata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | E <i>moenia</i> mestno obzidje, obzidan; glede na obrobijeno osrednje polje. 2 <i>Scopolijev</i> glede na Scopolija, ki je vrsto opisal na Kranjskem. | Scopolijev temnikar |
| 8240 | <i>S. mucronata</i> (Scopoli, 1763) | Carnelutti, 1992a | E <i>mucronatus</i> konicasti, glede na konicasti vrh kril. | konicasti temnikar |
| 7641 | <i>Selenia</i> Hübner, [1823] | | E <i>selene</i> mesec, luna; glede na lunaste lise na krilih. | lunar |
| 7642 | <i>S. dentaria</i> (Fabricius, 1775) | Hafner, 1911b | E <i>dens, dentis</i> zob, glede na zobate konice kril. 2 <i>tročrti</i> glede na tri prečne črte na sprednjih krilih. | tročrti lunar |
| 7643 | <i>S. lunularia</i> (Hübner, 1788) | Hafner, 1911b | E <i>lunaria</i> lunica, glede na lunicam podobne okrogle lise na krilih. 2 <i>dvočrti</i> glede na dve prečni črti na sprednjih krilih. | dvočrti lunar |
| 7643 | <i>S. tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767) | Hafner, 1911b | E <i>tetra</i> štiri, <i>lunaria</i> lunica, glede na štiri lunasta znamenja na krilih. | četverni lunar |
| 7767 | <i>Seliosema</i> Hübner, [1823] | | S <i>selis</i> prazni prostor, <i>sema</i> znak, znamenje? 2 <i>pasar</i> glede na široki temni zunanji rob ali pas na krilih. | pasar |
| 7768 | <i>S. brunnearia</i> (De Villers, 1789) | Hafner, 1911b | E <i>brunneus</i> rjav, rjavkast, glede na osnovno barvo kril. | rjavkasti pasar |
| 7916 | <i>S. plumaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Carnelutti, 1992a | E <i>plumbus</i> svinec; glede na svinčeno sivo barvo. | sivkasti pasar |
| 7916 | <i>Siona</i> Duponchel, 1829 | | E <i>Sion</i> domnevno po gori Sion; S domnevno po bot. rodu <i>Sium</i> sp., koščica. 2 <i>črtalar</i> po značilnih črnih črtah na belih krilih. | črtalar |
| 8417 | <i>S. lineata</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1911b | E <i>linea</i> črta, linija; po značilnih črnih, žilah na belih krilih. | beli črtalar |
| 8417 | <i>Spargania</i> Guenee, [1858] | | E <i>Sparganium</i> bot. rod ježek? 2 <i>vrbovčar</i> glede na vrbovec, <i>Epilobium</i> sp., eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic. | vrbovčar |
| 7532 | <i>S. luctuata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Hafner, 1911a | E <i>luctus</i> žalost, žalovanje. 2 <i>črni</i> glede na prevladujočo črno barvo kril. | črni vrbovčar |
| 7534 | <i>S. cararia</i> (Hübner, [1790]) | Hafner, 1911b | E <i>steganos</i> skriti, pokriti; ker gosenice živijo skrito življenje. 2 <i>topolar</i> glede na topol, <i>Populus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | topolar |
| 7533 | <i>S. dilectaria</i> (Hübner, [1789]) | Lesar, 1998a | S <i>carus</i> domnevno vreden, cenjen; glede na lep, "dragocen" vzorec na krilih. | lepi topolar |
| 7533 | <i>S. trimaculata</i> (De Villers, 1789) | Hafner, 1911b | S <i>dilectus</i> cenjeni, dragoceni; verjetno glede na redkost metuljev te vrste. | dragoceni topolar |
| 7533 | | | E <i>tri</i> - tri, <i>maculata</i> pega, lisa; ki ima tri pege na sprednjem robu kril. | tropegi topolar |

| | | | | | |
|------|---|----------------------------|--|--|----------------------|
| | <i>Synopsis</i> Hübner, [1825] | | | S. <i>synopsis</i> pregled; nejasen metuljarski pomen. 2. <i>rjavinar</i> glede na rjave prečne črte, ki tvorijo vrstno specifični vzorec. | rjavinar |
| 7733 | <i>S. sociaria</i> (Hübner, [1799]) | Hafner, 1911b | | <i>S. socius</i> tovariš, sodrug; se nanasa na podobnost z vrstami iz rodu <i>Boarmia</i> . 2. <i>stepski</i> glede na stepsko, življenjsko okolje. | stepski rjavinar |
| | <i>Tephronia</i> Hübner, [1825] | | | E. <i>tephros</i> pepelne barve; glede na osnovno barvo krlj. 2. <i>serec</i> , žival sive barve; glede na značilno barvo krlj. | serec |
| 7812 | <i>T. sepiaria</i> (Hufnagel, 1767) | Carnelutti, 1992a | | S. <i>sepiia</i> sipa, sipine barve. 2. <i>lišajski</i> glede na lišaje, hranilne rastline gosenic. | lišajski serec |
| | <i>Thalera</i> Hübner, [1823] | | | E. <i>thaleros</i> cvetoč, svež, mladosten. 2. <i>resarček</i> glede na šope resic na robovih krlj. | resarček |
| 7998 | <i>T. fimbrialis</i> (Scopoli, 1763) | Hafner, 1910 | | E. <i>fimbriata</i> resice, resast, z resami obrobljen; glede na šope rdečkastih resic na robovih krlj. 2. <i>zeleni</i> glede na barvo krlj. | zeleni resarček |
| | <i>Thera</i> Stephens, 1831 | | | E. otok v Egejskem morju; brez metuljarskega pomena. 2. <i>igličar</i> ker se gosenice hranijo z iglicami iglastega drevoja. | igličar |
| 8358 | <i>T. britannica</i> (Turner, 1925) | Carnelutti, 1989 | | E. <i>britannica</i> glede na nahajališče v Britaniji. 2. <i>nazobčan</i> glede na nazobčane tupalnice v primerjavi s <i>T. variata</i> . | nazobčani igličar |
| 8361 | <i>T. cognata</i> (Thunberg, 1792) | Hafner, 1911a | | E. <i>cognatus</i> soroden po rojstvu; glede na sorodni vrsti <i>T. obeliscata</i> in <i>T. variata</i> . 2. <i>gorski</i> glede na gorsko življenjsko okolje. | gorski igličar |
| 8364 | <i>T. cupressata</i> (Geyer, [1831]) | Carnelutti & Micheli, 1955 | | E. <i>Cupressus sempervirens</i> vednozelena cipresa, značilna hranilna rastlina gosenic. | cipresin igličar |
| 8362 | <i>T. juniperata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | | E. <i>juniperata</i> brinov; glede na brin, <i>Juniperus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic. | brinov igličar |
| 8356 | <i>T. obeliscata</i> (Hübner, 1787) | Hafner, 1910 | | S. <i>obeliscos</i> obelisk, lok; glede na obliko mediane lise. | lokasti igličar |
| 8357 | <i>T. variata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1910 | | E. <i>variatus</i> spremenljiv; glede na spremenljivi vzorec na krilih metuljev. | spremenljivi igličar |
| 8360 | <i>T. vetustata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1910 | | E. <i>vetustus</i> star, staričav. 2. <i>črnolisi</i> glede na črne lise na pretežno belih krilih. | črnolisi igličar |
| | <i>Theria</i> Hübner, [1825] | | | E. <i>thereios</i> divja žival, divjak? 2. <i>črnotmar</i> po črnem trnu, <i>Prunus spinosa</i> , značilni hranilni rastlini gosenic. | črnotmar |
| 7834 | <i>T. primaria</i> (Haworth, [1809]) | Lesan, 1997 | | E. <i>primarius</i> prvi, zgodnji. 2. <i>zimski</i> , glede na letni čas pojavljanja metuljev pozimi, že januarja ali februarja. | zimski črnotmar |
| 7833 | <i>T. rapicarparia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775) | Hafner, 1911b | | E. <i>rapicarpa</i> divja koza, gams; glede na podobno barvo. 2. <i>zgodnji</i> glede na letni čas pojavljanja v zgodnji pomladi. | zgodnji črnotmar |
| | <i>Thetidia</i> Boisduval, 1840 | | | E. <i>Thetis</i> boginja morja; brez metuljarskega pomena. 2. <i>smaragdnik</i> glede na smaragdno zeleno barvo krlj. | smaragdnik |

| | | | | |
|------|---|----------------------------|--|--|
| 7975 | <i>T. smaragdaria</i> (Fabricius, 1787) | Hafner, 1910 | E. <i>smaragdus</i> smaragd, žlahtni kamen; glede na barvo kril. 2. <i>belopiki</i> glede na značilno belo piko na srednjih krilih. | belopiki smaragdnik |
| 8028 | <i>Timandra</i> Duponchel, 1829 <i>T. comae</i> A. Schmidt, 1931 | Hafner, 1910 | E. <i>Timandra</i> hči Tindareusa; brez metaljarskega pomena. 2. <i>kislčar</i> glede na eno od značilnih hranilnih rastlin. D. <i>komae</i> z dolgimi lasmi, ponašati se? 2. <i>premočrtiglede</i> na poudarjeno ravno črto preko vseh kril. | kislčar premočrti kislčar |
| 8668 | <i>Trichopteryx</i> Hübner, [1825] <i>T. carpinata</i> (Borkhausen, 1794) | Hafner, 1910 | E. <i>trikthous</i> trojka, trojni; glede na dodatno krilno krpico, tretje krilo. | trokrilec |
| 8667 | <i>T. polycommata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775) | Hafner, 1910 | E. <i>Carpinus</i> bot. rod gaber; ena od hranilnih rastlin gosenic. | gabrov trokrilec |
| 8428 | <i>Triphosa</i> Stephens, 1829 <i>T. dubitata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1910 | E. <i>polus</i> mnogo; <i>komma</i> proga, črta, vejica, znamenje; z mnogimi črtami. E. <i>tri</i> - tri, trojni; <i>phaos</i> , <i>phos</i> blesk, sijaj; glede na močan lesket ali sijaj kril. | mnogočrti trokrilec sijajnež |
| 8427 | <i>T. sabaudia</i> (Duponchel, [1831]) | Hafner, 1910 | E. <i>dubitatius</i> dvomljiv; ima dvomljiv taksonimski položaj. 2. <i>rjavkasti</i> glede na osnovno barvo kril. S. <i>Sabaudia</i> Savoja, savojski, glede na geografsko območje nahajanja v Franciji. 2. <i>sivkasti</i> glede na osnovno barvo kril. | rjavkasti sijajnež sivkasti sijajnež |
| 8650 | <i>V. blomeri</i> (Curtis, 1832) | Carnelutti & Micheli, 1955 | E. <i>Venus</i> boginja ljubezni in lepote. 2. <i>lepoticnik</i> po lepem in ljubkem videzu metaljev tega rodu. | lepoticnik |
| 8652 | <i>V. cambrica</i> Curtis, 1839 | Hafner, 1911a | E. C. Blomer britanski zbiralec (1783 - 1835). 2. <i>brestov</i> po brestu, <i>Ulmus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. E. <i>Cambria</i> Cymranimska pokrajina v Angliji, tipška lokaliteta. 2. <i>jerebikin</i> po jerebiki, <i>Sorbus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic. | brestov lepoticnik jerebikin lepoticnik |
| 8248 | <i>Xanthorhoe</i> Hübner, 1825 <i>X. biriviata</i> (Borkhausen, 1794) | Hafner, 1911a | E. <i>xanthos</i> rumen; <i>rhoe</i> tok (vodni), teči, potok. 2. <i>listarček</i> glede na lastnosti metaljev tega rodu, da radi posedajo po listih. E. <i>bi</i> - dva, dvojni; <i>rivus</i> tok, potok, vijuga; se nanaša na dve valoviti prečni črti v bazalnem delu krila. | listarček dvočrti listarček |
| 8249 | <i>X. designata</i> (Huflangel, 1767) | Hafner, 1911a | E. <i>designo</i> označiti, določiti; glede na poudarjen vzorec sredinskega traku. | poudarjeni listarček |
| 8253 | <i>X. ferrugata</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911a | E. <i>ferrugo</i> železna rja; glede na barvo osrednjega traku. | rjasti listarček |
| 8256 | <i>X. fluctuata</i> (Linnaeus, 1758) | Hafner, 1911a | E. <i>fluctus</i> val, valovit; glede na valovite prečne črte na krilih. | valoviti listarček |
| 8259 | <i>X. incurvata</i> (Hübner, [1813]) | Hafner, 1911a | S. <i>incurvatus</i> utrujen, načet; glede na slabo vidne prečne črte. | sivkasti listarček |

| | | | | |
|------|--|---------------|---|----------------------|
| 8255 | <i>X. montanata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>E. montanus</i> gora, gorski; glede na značilno življenjsko okolje. | gorski listarček |
| 8254 | <i>X. quadrifasciata</i> (Clerck, 1759) | Hafner, 1911a | <i>E. quadri štiri; fascia</i> trak; glede na obliko srednjega traku, ki lahko sopominja na številklo štiri. | četverni listarček |
| 8252 | <i>X. spadicearia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911a | <i>E. spadix</i> orehovorjav; glede na barvo osrednjega dela sredinskega traku. | rjavi listarček |
| | <i>Yezognophos</i> Matsumura, 1927 | | <i>Yezognophos</i> nejasni metuljarski pomen. 2 <i>naskalnik</i> glede na skalno življenjsko okolje v visokih gorah do 2800 m visoko. | naskalnik |
| 7889 | <i>Y. dilucidaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911b | <i>E. dilucidaria</i> čisti, jasen, razločen. 2 <i>modrikasti</i> glede na barvo knil. | modrikasti naskalnik |
| 7891 | <i>Y. serotinaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hafner, 1911b | <i>E. serotinus</i> pozni, ki pozno pride; glede na letni čas pojavljanja? 2 <i>okrasti</i> glede na barvo knil. | okrasti naskalnik |
| 7893 | <i>Y. vitaria</i> (Thunberg, 1792) | Hafner, 1911b | <i>S vitia Binde</i> "živi rob"; glede na temni rob srednjega polja. | temnorobi naskalnik |

